




卷

四

吉慶堂



十日藏書



BGA2936
U.3

濟陰縣志目錄卷之四

吳興

金德生

聞風父輯著

白嶽

曹啟祚長胤父訂正

濟陰綱目卷之四

吳興 金德生聞風父輯著 白嶽 曹啟祥長胤父訂正

西陵 汪 淇 澹漪子箋釋 天都 查 望千周父參閱

○虛勞

○論婦虛勞與男子不同

補中益氣是
治勞倦內傷
之劑乃初治
法非久病勞
瘵骨蒸所宜

精血雖殊而
虛勞形症不
遠治亦不異
宜與雜症參

準繩云。勞倦所傷。用補中益氣湯調治。乃暴病也。失治而有發熱。潮熱盜汗。欬嗽諸證出焉。謂之虛勞。又復失治。而有皮聚毛落。飲食不為肌膚。骨髓中熱。經閉不行。諸證出焉。謂之瘵。骨蒸熱。至於傳尸之疾。別自一種。其源不起於勞欲。其流或至於滅門。余於雜病首冊。則既條分而備列矣。然男以精為主。女以血為主。其致病既殊。其施治亦異。故應別著方法。而陳氏良方分勞瘵骨蒸勞血

看
按血風勞者
用血虛而風
熱成勞也風
勞冷勞因虛
乘釐日久變
成勞熱氣虛
者氣不足熱
勞者血不足
至骨蒸勞瘵
大都難治矣

風勞氣虛勞風勞冷勞熱勞客熱等門未免惑亂後人靡所適從今釐正如左醫者更參雜病虛勞傳尸勞二門而用之則無遺少之患矣

○論初病大法

保命集云治婦人虛勞局方中謂首尾六合如大聖散熱地黃丸是治無熱虛勞也中道藥牡丹煎丸空心食前人參荊芥散臨臥食後是治有熱虛也

戴氏曰有病後血虛者有本體血虛者其人往來寒熱或五心發熱言語無力面色痿黃頭目昏暈交生諸疾芎歸湯加羊肉少許或十全大補湯四物湯養榮湯服之血虛而氣旺者宜抑氣湯即香附末

無執虛勞乃

陽虛症其病

自上而下損

之脈也法宜

溫補惟東垣

元禮立齋先

主獨得其治

宜宗之氣虛

易補宜早為

妙不比有熱

虛勞之難療

理也

有熱無執可

以占氣血虛

實矣立齋証

治方法可補

前論不足

論無執虛勞

大全云婦人冷勞屬血氣不足。臟腑虛寒。以致臍下冷痛。手足時

寒。月經失常。飲食不消。或時嘔吐。惡寒發熱。骨節痠疼。肌膚羸瘦。

面色痿黃也。

薛氏曰。前證有內外真寒。有內外真熱。有內真熱而外假寒。有內

真寒而外假熱者。若飲食難化。大便不實。腸鳴腹痛。飲食畏寒。手

足逆冷。面黃嘔吐。畏見風寒。此內外真寒之證也。宜用附子理中

湯。以回陽。八味地黃丸。以壯火。若飲食如常。大便堅實。胸腹痞脹。

飲食喜冷。手足煩熱。面赤嘔吐。不畏風寒。此內外真熱之證也。宜

用黃連解毒湯。以消陽。六味丸。以壯水。若飲食如常。大便堅實。胸

腹痞脹。飲食喜寒。手足逆冷。面黃嘔吐。畏見風寒。此內真熱而外

假寒也。亦用解毒湯六味丸。若飲食少思。大便不實。吞酸噯氣。胸腹痞滿。手足逆冷。面赤嘔吐。畏見風寒。此內真寒而外假熱也。亦用附子理中湯與八味丸。當求其屬而治之。經曰。益火之源以消陰翳。壯水之主以制陽光。使不知真水火之不足。泛以寒熱藥治之。則舊疾未去。新病復生矣。夫所謂屬者。猶主也。謂心腎也。求其屬也者。言水火不足而求之於心腎也。火之源者。陽氣之根。即心是也。水之主者。陰氣之根。即腎是也。非謂火為心源。為肝。水為腎主。為肺也。

以內外俱寒而不用附子理中何也。以內外真熱不用三黃解毒而以二味。

一婦食少作嘔。口吐痰涎。面黃腹痛。月經不調。手足逆冷。此內外俱寒之證。以六君加香附木香治之而癒。

一婦忽嘔吐酸水。內熱作渴。飲食不進。惟喜冷水。面色青赤。投之

之藥也。其餘如白朮等藥。

以藥入口即吐。此內外真熱之證。積十餘日。以黃芩一味。煎而投之。以藥入口即吐。此內外真熱之證。積十餘日。以黃芩一味。煎而投之。

以內外真熱... 傷胃耳... 有熱渴便秘... 二症故雖逆... 冷亦是假寒... 然亦有可下... 者后用六味... 丸求其屬也... 然須以脈有... 方無力分虛... 實

黃連者瀉火之源也其餘如白朮等藥者抑恐苦寒傷胃耳有熱渴便秘二症故雖逆冷亦是假寒然亦有可下者后用六味丸求其屬也然須以脈有方無力分虛實

此得熱因寒用之法從之

以藥入口卽吐此內外真熱之證積十餘日以黃連一味煎湯飲之徐加白朮茯苓仍加陳皮當歸炙甘草至月餘始進米飲稀粥調理而瘳

一婦內熱作渴大便秘結畏惡風寒手足逆冷此內真熱而外假寒先用黃連解毒湯後用六味丸而瘳

一婦初患痰喘熱渴醫以降火散氣治之肌日削而氣日索延至甲辰木旺痰盛身熱口腐腹脹神昏絕食幾死此虛熱無火投以壯火生土之劑隨服隨效越數歲夏初坐則頭墜不能起視臥則背冷覺風透體煩熱暈眩咳嘔痰湧手足麻冷此內真寒外假熱之證也遂以大補薑附之劑投之不三四服而大勢已平仍以前藥加減而瘳

此條已見帶下
此重復引證也

明是上實下
虛

得熱因寒用

韓懋治其嫂年三十餘十八胎九員八天會家難作驚憂過甚遂
昏昏不省人事口唇舌皆瘡或至封喉下部虛脫白帶如注如此
四十餘日或時少甦至欲自縊悲不能堪醫或投涼劑解其上則
下部疾愈甚或投熱劑及以湯藥熏蒸其下則熱暈欲絕此亡陽
證也急以鹽煮大附子九錢爲君制以薄荷防風佐以芎歸薑桂
之屬水煎入井冰冷與之未盡劑即睡通竅覺即能識人或曰此
何謂也曰方書有之假對真對真爾上乃假熱故以假冷之藥
從之下乃真冷故以真熱之藥從之斯上下和而病解矣繼以女
金丹錯綜以三三方不但去其疾且調治元氣無何連生二子
以上論及治驗有無當於虛勞者而實治寒與熱變通之太法
爾不可不察也

○此論有熱虛勞者前古諸公之方參用然陰虛難治以血生於氣
先無形而片有形也且滋陰之劑有害脾胃脾胃傷則氣損氣損

爾不可不察也

○論有熱虛勞

此屬陰虛乃自下而上至脉之病也宜以丹溪立

先無形而后有形也且滋陰之劑有害脾胃脾傷則氣損氣損則血無以生氣盛則火有所助誠難調治惟審胃氣有無以決治則此為良法耳

大全云婦人熱勞由心肺壅熱傷於氣血以致心神煩躁頰赤頭

疼眼澁唇乾口舌生瘡神思昏倦四肢壯熱飲食無味肢體痠疼

心悸盜汗肌膚日瘦或寒熱往來當審其所因調補氣血其病自

愈矣

薛氏曰熱勞乃壯火食氣虛火煎熬真陰之所致也王太僕云如

大寒而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發晝止是

無火也當治其心如大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止倏

忽往來時動時止是無水也當助其腎心盛則生熱腎甚則生寒

壯火食氣是言實火非同勞熱之火可補
太僕所論乃真水真火此根有生中來故當察屬以

妄之

竊謂以下諸

症或肝或脾

或肺而心腎

者甚少總以

分氣分血主

治却與求屬

之意不同

此下十二節

分經症虛實

定方確有見

解

濟世編目

卷四

四

腎虛則寒動於中。心虛則熱收於內。竊謂前證若肝脾血虛。用四

物參朮。肝脾鬱怒。小柴胡合四物湯。脾胃氣虛。補中益氣湯。肝脾

血虛。加味道遙散。肝經風熱。加味小柴胡湯。心經血虛。天王補心

丹。肺經氣虛。人參補肺湯。肝經血虛。加味四物湯。天抵午前熱屬

氣分。用清心蓮子飲。方見雜病赤白濁午後熱屬血分。用四物湯。參朮牡

丹皮。熱從左邊起。肝火也。實則四物湯。龍膽山梔。虛則四物參朮

黃耆。熱從臍下起。陰火也。四物參朮黃檗知母酒拌炒黑。五味子

麥門冬。肉桂。如不應急。用加減八味丸。不時而熱。或無定處。或從

脚心起。此無根虛火也。用加減八味丸。及十全大補湯。加麥門五

味主之。

一婦經行不調。飲食少思。日脯熱甚。此肝脾氣血俱虛。用十全大

補。加山茱萸。山藥。杜仲。丹皮。麥門。五味。而治。久年。形寒。熱如。瘧。仍用。

一婦經行不調飲食少思日補熱甚此肝脾氣血俱虛用十全大

補加山茱萸山藥牡丹皮麥門五味而瘥次年秋寒熱如瘧仍用
前藥而瘥一婦生育多胎經月不調兩足發熱年餘其身亦熱勞
則足瘕痛又年許唇腫裂痛又半年唇裂見血形體瘦倦飲食無
味月水不行此氣血俱衰之證彼誤用通經丸等藥復傷氣血遂
致不起

○論瘥骨蒸熱

瘥有鬼鬼病
常察故瘥字
從之昌氏吟
方有瘥瘥法
有以癸亥夜
半跪禱北斗
者皆瘥瘥法
也若果有瘥
鬼亦必是孽
鬼為祟藥石

準繩云五勞六極七傷諸證治已見雜病虛勞門茲不贅敘婦人
致此多因經行胎產或飲食起居七情重傷肝脾之所致又或失
於調攝或過於攻伐而成與男子治法稍有不同故彙集古禁方
專治婦人者於此若欲窮其源流更當稽之彼籍

良方云骨蒸勞者由積熱附於骨而然也亦曰傳尸施婦復連無

云何此至肺之病也。夫腎主骨。骨至于蒸。真陰竭矣。陽何以依。而傳肝無辜。皆是壁

辜其名不一。此病皆由脾胃虧損所致。其形羸瘦。腹脹泄痢。肢體無力。傳於腎。則盜汗不止。腰膝冷痛。夢鬼交侵。小便赤黃。傳於心。則心神忪悸。喜怒不時。頰唇赤色。乍熱乍寒。傳於肺。則胸滿短氣。咳嗽吐痰。皮膚甲錯。傳於肝。則兩目昏暗。脇下妨痛。閉戶忿怒。五臟既病。則難治療。

論血風勞

肝熱生風。故病名血風。目勞者。病久血虛。月候不行。而發熱不止也。此是肝腎之陰不足。當從至脈主治。

太主云。婦人血風勞證。因氣血素虛。經候不調。或外傷風邪。內挾宿冷。致使陰陽不和。經絡否滯。腹中堅痛。四肢痠疼。月水或斷或來。面色痿黃羸瘦。又有因產後未滿百日。不謹將護。臟腑虛腫。百脈枯竭。遂致勞損。久不瘥。則變寒熱。休作有時。飲食減少。肌膚瘦瘠。遇經水當至。即頭目昏眩。胸背拘急。四肢疼痛。身體煩熱。足重

面黃。或經水不通。或調之血風勞也。

此謂經水當至即頭目昏眩胸背拘急四肢疼痛身體煩熱足重

面浮或經水不通故謂之血風勞也

薛氏曰東垣云喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣氣衰則火旺火旺則乘其脾土脾主四肢故因熱懶言動作喘乏表熱自汗心煩不安當病之時宜安心靜坐存養其氣以甘寒瀉其熱氣以酸味收其散氣以甘溫補其中氣經言勞者溫之損者溫之要略云平人脉大為勞以黃耆建中湯治之

一婦人勞則足跟執痛此是三陰血虛用聖愈湯而痊後遍身瘙癢誤服風藥發熱抽搐肝脉洪數此肝家血虛火盛而生風以天竺黃膽星為丸用四物麥門五味苓連炙甘草山梔柴胡煎送而

瘉

此所謂風勞也當從損脉治此下諸方於虛損初病者

一婦素清苦勤於女工因感風邪自用表散之劑反朝寒暮熱自

宜酌用之

夫血病治血

氣病治氣人

所易知而血

病補氣氣病

補血人未盡

知故四物復

有增損之法

蓋以地黃滯

氣而損脾非

四肢怠惰乏

力少氣者所

宜故當損而

人參甘草所

以益脾也故

增若炮薑既

能溫中又能

引血以歸氣

此增損之妙

也

汗盜汗形氣虛甚其脉或浮洪或微細其面或青白或痿黃此邪去而氣血愈虛也用十全大補湯三十餘劑漸瘳又用加味道遙

散兼治半載而痊

○治虛勞平補諸方

增損四物湯

治婦人氣血不足四肢怠惰乏力少氣兼治產後

下血過多榮衛虛損陰陽不和乍寒乍熱

當歸

川芎

白芍藥

人參

乾薑

炮薑

甘草

各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎至六分去滓執服

六神湯

治脾氣不和榮衛不足怠惰困倦不嗜飲食服之補養

真氣進美飲食充澤肌膚

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

黃耆

地骨皮各等

者得氣也

不可執此方

右為龍牙

台血虛心煩

睡臥不安

或五心煩熱

或五心煩熱

或五心煩熱

或五心煩熱

或五心煩熱

按充肌澤膚者衛氣也。氣不可熱。此方以黃芪益衛氣。而又以地骨皮清衛熱。則無壯火食氣之虞。又以四物引衛氣以歸四臟。而生血。則又有少火生氣之用。如是則榮衛足而困倦去矣。其曰脾不和。不嗜食。亦為氣不足之病。氣足則愈也。宜知之。

右為養元。每服五錢。水煎。空心溫服。

聖愈湯。治血虛心煩。睡臥不寧。或五心煩熱。

黃耆

當歸 酒洗各一錢

人參

川芎

熟地黃 酒洗

生地黃

酒洗各五分

右水煎服。

加減大建中湯。

治婦人胎前產後一切虛損。月水不調。脘腹病

痛。往來寒熱。自汗口乾煩渴。

芍藥

二兩 當歸

川芎

黃耆

肉桂

各一兩

白朮

甘草

炙各七錢五分

右為末。每服二錢。加薑棗水煎服。食前。

當歸建中湯。治婦人一切血氣不足。虛損羸乏。

聖愈湯重

血虛心煩

字然去白芍

而用生地者

所以涼心生

血也川芎之

用豈為火鬱

宜散歟不若

以麥門冬易

之

按前三方一

用參薑以溫

中一用黃芪

地骨以益衛

清熱以參芪

並用而中外

兩補均以四

物加減為血

分居多此名

建中又重在

氣也然桂之

當歸四兩

白芍藥炒六兩

肉桂去皮

甘草炙各二兩

右咬咀每服三錢加生薑三片棗二枚水煎空心服此方以歸芍為主而

無著米雖薑棗和中然在血分建業知配合之妙則知古人之心

雙和散治一切大病之後虛勞乏力補血益氣

黃耆

熟地黃

當歸

川芎

白芍藥炒各一錢

肉桂

甘草炙各五分

右咬咀每服四錢加生薑三片棗二枚水煎服

補中益氣湯治形神勞倦或飲食失節以致脾胃虛損清氣下

陷發熱頭痛四肢倦怠心煩肌瘦目漸羸弱

黃耆

人參有嚙去之

白朮名一錢

甘草炙王

當歸

陳皮各七分

升麻

柴胡各三分

色可以通榮
血桂之氣味
可以通榮氣
故本經以之
通血脈又同
葦朮甘草薑
朮等則建中
之功尤大矣
以其兼中上
也雙和者專
和榮衛而非
建中意也然
即大建中湯
以白水易熟
地而分兩亦
殊要知古人
不執方不泥
法讀之令人
有言外之意

右作一服。水煎食遠稍熱服。

八珍湯。治脾胃虧損。氣血俱傷。益人之生以脾胃為主。脾胃一

虛諸臟失所。百病生焉。

即四君子合四物湯。加薑棗煎服。

歸脾湯。治脾經失血。少寐發熱盜汗。或思慮傷脾。不能攝血妄

行。或健忘怔忡驚悸。或心脾傷痛怠惰嗜臥。飲食不思。

方見血崩門。勞傷條。

黃耆散。治勞氣食後身疼痛。夜間盜汗。此因失血榮衛損也。

黃耆一兩 防風 當歸 白芍藥 乾地黃各七錢五分

甘草炙半兩

右每服五錢。薑三片。棗一枚。水煎食前溫服。

夫形勞者氣傷於外神勞者氣傷於內

飲食不節者中氣受傷傷則水穀衰少

後天氣病而上下二焦亦無所養故以甘溫之劑以益上中之氣而又妙在升榮以舉下陷之陽使榮衛和而氣自益也氣益則何病之有故東垣先生一生得力盡在于此其本方加

桔梗引子 治心不足解勞倦益血

黃耆

人參

麥門冬

去心桔梗

甘草

炙各二兩青皮半兩

右為末每服三錢水一盞煎七分溫服

桔梗飲食氣不足也故以參耆甘草為君加麥

門者所以通心而清火桔梗載諸藥以益上焦之氣青皮利膈氣以制諸藥之壅所謂血生於氣

叔勞散

治心腎俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱熱過即冷時

有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜臥恍惚神氣不寧睡

多異夢此藥能治微嗽有唾唾中有紅線名曰肺痿失治便成

羸劣之疾

白芍藥

六兩

黃耆

蜜炙四兩

人參

去青

白茯苓

半夏

湯炮七次

甘草

炙

當歸

去蘆酒洗

五味子

阿膠

炒

熟地黃

洗淨焙乾各三兩

右以咀每服三錢生薑七片棗三枚水煎溫服日三

此其本方加

右以明每服三錢生薑七片陳三枚水煎溫服

減法更妙詳

補肺湯

治勞嗽五臟虛損喘熱發熱盜汗自汗唾痰喘嗽

之砂安神丸

人參

黃芪

柴花

五味子

熟地黃

之意同宜思

桑白皮

炒各一錢

天腎液入心

右剉水煎入蜜少許食後服

為汗而汗者

補中丸

治婦人虛損諸疾

氣者衛氣也

白朮

熟地黃

白芍藥

川芎

衛氣者晝行

黃耆

人參

陳皮

陽則為氣為

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五七十丸溫水下

汗者為行陰

人參丸

養陰生血補虛

之氣反竅而

人參

白朮

鹿角膠

當歸

芍藥

川芎

也此方用黃

熟地黃

各等分

固表防風為

之使歸地

六

黃引氣樂以
歸陰甘草從
中以和榮衛
故諸症愈矣

人身以氣血
為用五臟以
心腎為主心
腎者氣血之
父母此方以
三物補氣以
三物補血以
三物止嗽消
痰歟肺脩矣
然生夏性燥
損血用之何
居蓋氣以黃
芪為君血以
白芍為君而
又以熟地阿

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心米飲下

七補丸 治婦人氣血虛弱衝任不和腹中經結狀若懷孕月候

尚來未分經脈宜服此方

當歸

川芎

芍藥各三錢

熟地黃

白朮

白芷

阿膠炒各二分

右為細末煉蜜丸桐子大每服五六十丸空心米飲下

十補丸 治婦人諸虛百損榮衛不調形體羸瘦面黃背倦口苦

舌乾心忪多汗血衰氣盛寒熱往來一切血崩帶下墮胎落孕

此藥皆治孕婦服之尤有神效

熟地黃

淨洗酒浸蒸過焙乾稱重四兩

肉苁蓉

酒浸焙乾

人參

黃耆

去蘆蜜炙

當歸酒

川芎

白芍藥

白茯苓

白朮

去蘆炒各二兩

肉桂一兩 甘草半兩

膠潤燥五味
人參生津則
又何害于燥
然以之治微
嗽有唾則可
若以之治紅
線則非今人
所敢及也幸
斟酌之況用
人參黃芪尤
未敢輕用
有調嗽息參
芪痰忌熟地
而此方驟用
之非得知也
此即八珍意
而陳皮茯苓
之取舍當思
之
此亦八珍意

肉桂去皮甘草牛兩

右爲細末用好酒調山藥末打糊丸如桐子大每服六七十丸
食前米湯或溫酒下

滋陰百補丸 治婦人勞傷氣血諸虛百損五勞七傷陰陽不和

乍寒乍熱心腹疼痛不思飲食尪羸乏力

香附一觔用酒醋鹽湯童便各浸四兩焙乾益母草半觔當歸酒洗六兩川芎

熟地黃薑汁炒白朮各四兩白芍藥炒三兩玄胡索炒人參

白茯苓各二兩甘草炙一兩

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服五六十丸砂仁湯或酒或醋湯白滾水任下空心服

羊乳丸 治虛勞羸瘦

也以為丸故去其以痰滲故去茯苓而鹿角膠之用非以其為氣血之屬而補腎脉充腦髓乎人參丸四物阿膠可以補任脉之虛自末白芷可以調衝脉之氣以其經結如孕經脉末分故製方如此七補丸此即十全大補湯加肉桂從蓉也本草以從蓉為黑

黃耆蜜炙 地黃酒浸 秦芫 山茱萸肉 柴胡 地骨皮等分

右為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸煎人參湯下不拘時候

日進三服

六味丸一名地黃丸一名腎氣丸 治腎經不足發熱作渴小便淋瀝氣壅痰

嗽頭目眩暈眼花耳聾咽燥舌痛齒牙不固腰腿痠軟自汗盜

汗便血諸血失音水泛為痰血虛發熱等證其功不能盡述

熟地黃八兩 山茱萸肉 乾山藥各四兩 牡丹皮 白茯苓

澤瀉各三兩

右各另為末和地黃膏加煉蜜丸如桐子大每服七八十丸空

心食前滾湯下

八味丸 治命門火衰不能生土以致脾胃虛弱飲食少思大便

婦人絕陰不... 益公... 治諸... 或寒熱往來五

八味丸 治八門火衰不能生土以致脾胃虛弱飲食少思大便

司命能治男
子絕陽不興
婦人絕陰不
產故加之然
丸方用甘草
者甚少而此
乃如方用之
又不以蜜丸
而以酒調山
藥為糊者欲
使丸無大緩
之能功有十
全之方也
此方不惟理
氣補虛而且
善調經種子
然有甘草而
又以蜜為丸
者為以香附

不實。脘腹疼痛。夜多漩溺等證。即六味丸加肉桂附子各一兩

益陰腎氣丸。治諸臟虧損。發熱。肺熱。潮熱。盜汗。或寒熱往來。五

心煩熱。或口乾作渴。月經不調。或筋骨痠倦。飲食少思。或頭目

不清。痰氣上壅。咳嗽。肺甚。胸膈痞悶。或小便赤數。兩足熱痛。或

脚足痿軟。肢體作痛等證。此壯水之主。以制陽光之劑。

熟地黃八兩 柞膏 山茱萸肉 山藥各四兩

白茯苓 牡丹皮 澤瀉各三兩 當歸

五味子炒各二兩 生地黃酒浸 柞膏

右為末。入二膏。加煉蜜。丸如桐子大。硃砂為衣。每服五十丸。空

心淡鹽湯下。

烏雞煎丸。治婦人百病。血氣虛勞。赤白帶下等證。

益母為君故
無傷于甘草
而緩也有糖在

此方以黃芪
補上焦元氣
而配以地骨

之苦寒是補
氣不補火以
熟地補下焦

之水而配以
山茱之溫溫

是補水而又
生肝柴胡散

結熱之氣秦
茱利一身之

机方以羊乳
名者以參芪

有羊肉之功
也羊乳丸

此方原名腎

黃耆 當歸各六兩 香附子四兩 白茯苓三兩 人參 官桂

熟地黃 生地黃 地骨皮各二兩

右為烏骨白鷄一隻男用雌女用雄籠住將黃耆末和煖麵丸

鷄頭實大喂鷄眼生眇弔死去腸肚及毛洗淨槌碎骨同前藥

並納鷄腹內用酒醋各一瓶煮一宿取骨焙乾並研為末用汁

打糊丸如桐子大每服五十丸鹽湯下

人參驚甲丸 治婦人一切虛損肌肉瘦瘠盜汗心忪咳嗽上氣

經脉不調或作寒熱不思飲食 人參 當歸 赤芍藥 杏仁湯浸去皮尖炒 甘草炙

桔梗去蘆 柴胡各一兩 地骨皮 宣黃連各一錢半 胡黃連各一錢半

肉桂去粗皮 木香各半兩 麝香另研五分 鼈甲一枚重二兩者醋炙黃色

此方有...
氣丸為以賢
中有生氣也
賢為坎命門
同之命門之
氣宜藏而不
宜泄故口慳
臟以其受五
臟六腑之精
而藏之也本
方以地黃滋
腎陰以山茱
山藥扶元澤
湯補四臟之
氣降而歸腎
而丹皮以瀉
陰中伏火火
去而氣生精
長所以四臟
皆有氣而生
生不旁也名

右為細末。用青蒿一觔。研爛絞汁。童子小便五升。酒五升。同熬至二升。次入真酥三兩。白砂蜜三兩。再熬成膏。冷方下。眾藥未搜和令勻。丸如桐子大。每服五十丸。溫酒送下。無時。

艾煎丸。治婦人諸虛。

杜艾葉 大當歸各二兩 香附子四兩

右醋煮半日。焙乾為末。再用醋煮糊丸。艾醋湯下。

薯蓣丸。補虛。

黃薯四兩 鹽水浸火炙 北五味二兩

右為末。糯米糊丸。空心鹽酒下。

○治無熱虛勞

附子理中湯。治真陽不足。飲食難化。大便不實。腸鳴腹痛。飲食

畏寒手足逆冷

白朮

人參

乾薑炮

甘草炙

附子

炮去皮臍各等分

右剉每服四錢加生薑十片水煎服

黃蓍建中湯治男子婦人諸虛不足羸之少力此藥大生氣血

補益榮衛

黃蓍

三錢

白芍藥

炒四錢

肉桂

一錢半

甘草

炙二錢

右咬咀作一服加薑棗水煎食前服

加味黃蓍湯治陽虛惡寒

黃蓍

二錢

人參

白朮

甘草

炙各一錢

肉桂

五分

右剉水煎服甚者加附子

十全大補湯治婦人冷勞最妙

曰腎氣豈無謂乎若八味者又溫生氣于陰之中以補火生土也故下元虛而腹痛漩溺者宜之六身丸按腎氣丸立自仲景主作納氣歸元故名之今加益陰二字乃添蛇足也豈立方之旨哉若五味猶能飲氣生津生地尚可涼血瀉火或少佐之庶幾近理而

火或少佐之
當歸之用
失之矣或曰

歸味辛可
潤賢燥殊
不知辛溫之
所乃流行之
物非所以納
氣也蓋腎為
水藏而陰生
所謂水深土
厚也動則氣
散而水溢所
謂失藏其用
也觀水歸冬
旺而反涸長
夏火旺而水
行可想命名
之義矣辛溫
之物加于納
氣丸中宜乎

方見經閉血枯條

渾身碎痛引子 治婦人勞倦

虎骨

錢五

防風

藁本

白芷

茯苓

甘草

白朮

當歸

芍藥

續斷

附子

錢各一

右為麗末薑棗煎服不拘時

木香丸 治婦人冷勞經脈不調臍氣滯四肢疼痛飲食無味

漸加羸瘦

木香

琥珀

吳茱萸

炮

當歸

牡丹皮

赤芍藥

三稜

附子

炮

延胡索

川芎

錢各七

乾薑

人參

桂心

各半

北柴胡

白朮

鰾甲

醋炙去

厚朴

熟地黃

陳橘皮

各一

否乎

雞翼禽也鳥

骨白毛金水

相生木無火

燥之義子婦

人所宜者肘

水為用而陰

生陽長也但

此方所製諸

藥雖以氣血

為主然參茸

同官桂則溫

補太過苟非

血虛氣弱者

不可此方治

虛損者故用

參歸氣血

則津液枯而

肌肉瘦故用

酥蜜以潤之

治法

卷四

一三

右為未煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心溫酒下

戊巳丸 治新婚男子女人素稟虛寒滑泄飲食無味肌肉不生

多睡少寐終日昏蒙夜多異夢畏寒喜熱喫食嘔吐清水狀如

翻胃此藥養脾開胃滋血氣長肌肉添精益髓補煖丹田

茴香 白茯苓 香附子 炒各三兩 胡椒五兩 人參

甘草 炙各一兩 白朮 二兩 硃砂 半兩 研細

右為細末生薑汁打糊丸如桐子大每服二三十丸空心食前

白湯下日三服

礞砂丸 治婦人冷勞心腹積聚腹脇疼痛四肢羸瘦不食

礞石 醋炙 桃仁 去皮尖 麩炒 木香 五靈脂 炒 當歸 各一兩

礞砂 二兩 醋一升 熬成膏

自酥蜜同吞
仁甘桔又可
潤肺下氣而
除嗽也然氣
不足則寒而
心忪血不足
則熱而盜汗
故又于補氣
血之中一加
柴胡地骨黃
連以除熱一
加肉桂木香
以溫寒赤芍
散血中之瘀
杏仁破氣中
之滯胡通響
甲青蒿童便
搜骨蒸之熱
而以射香為
引者是欲內

右為細末用硃砂膏為丸如桐子大空心溫酒下二十九此入硃砂
太多不宜輕用

○治有熱虛勞

逍遙散 治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪煩赤

口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不調臍腹脹

痛寒熱如瘧又主室女血弱陰虛榮衛不和痰癭潮熱肢體羸

痺漸成骨蒸

當歸酒 白芍藥酒 白朮 白茯苓 柴胡各一錢

甘草炙五分一方用一錢半

右剉散水一盞半生薑三片麥門冬二十粒去心煎七分不拘
時服○一方用薄荷少許無門冬

調氣調經行

血養血片艾

煎丸可以此

作祖金匱要略

此補氣秘方

也妙在用黃

芪以鹽水浸

灰用糯米以

作糊丸以其

能開胃也五

味為佐惟虛

而吸吸短氣

者宜之黃芪

此方只在理

中二字上休

認仲景原作

大九為煎和

熱甚加牡丹皮梔子炒

骨蒸加知母地骨皮

咳嗽加五味子紫苑

吐痰加半夏貝母瓜蒌仁

飲食不消加山楂神麴

發渴加麥門冬天花粉

胸中作熱加黃連梔子

心荒加遠志酸棗仁

吐血加阿膠生地黄牡丹皮

自汗加黃耆酸棗仁

久瀉加炒黑乾薑

道回服理中
妙處全在于
此今失其意
深可惜也如
大便不實者
遠宜遵之
理中者理氣
中之寒建中
者溫血中之
寒當歸建中
則溫榮以行
血黃芪建中
則溫衛以行
血曰大建中
則氣血俱溫
俱行矣用者
須得此意
裏氣足則外
氣充外氣固
則內氣足此

遍身痛加羌活防風川芎以利關節

手足顫掉加防風荆芥薄荷

氣惱胸膈痞悶加枳實青皮香附

怒氣傷肝眼目昏花加龍膽草黃連梔子

小腹痛加玄胡索香附子

經閉不通加桃仁紅花蘇木

左腹血塊加三稜蓬朮桃仁紅花

右腹氣塊加木香檳榔

黃耆散。治婦人勞熱羸瘦四肢煩疼心躁口乾不欲飲食

人參

黃芩

當歸

各七錢半

赤茯苓

赤芍藥

炒

生地黃

麥門冬法黃耆

地骨皮

各一兩

柴胡

一兩半

方內外相長

而以肉桂通

經脉于表裏

之間則陽虛

之寒釋矣其

加附子文兼

溫內也

主暈身之經

絡清肝也而

用所以藏血

以榮週身之

筋則一身之

碎痛當以肝

為主而生血

之本以脾為

土為脾統諸

經之血也防

風行肝氣干

過身白芷行

陽明于血海

甘草炙一錢半

右**咬明**每服四錢水一盞生薑五片煎六分去滓溫服無時

子芩散涼心肺解勞除熱使榮衛順血不絕

黃芪兩人參 白芍藥 白茯苓 子芩

麥門冬去心生地黃各半兩苦梗二不

右為**雀巢**先用竹葉一握小麥七十粒水三盞薑三片煎至一

盞半入藥末三錢重煎至七分去滓溫服

知母散治婦人勞熱體瘦壯熱四肢煩疼咽喉不利少思飲食

柴胡 生地黃各一兩知母 黃芩 赤芍藥

麥門冬去心射干 升麻各七甘草炙微赤

右為**鹿散**每服四錢水一中盞入生薑半分淡竹葉二十七張

以生血... 治婦人熱勞煩渴口乾體瘦無力四肢疼痛或時寒熱

甘本益中土
以生血歸芍
柴肝于水遇
身附于溫內
而通所不通
真本行上而
散至顛頂扶
外滲下而內
達九淵虎骨
續斷其搜筋
骨諸邪而定
痛者歟其自
治勞倦者必
每因勞倦而
遍身痛者也
此方補氣補
血破氣破血
溫氣行血通
氣養血非真

同煎至六分去滓不拘時溫服

半夏散 治婦人熱勞煩渴口乾體瘦無力四肢疼痛或時寒熱

痰逆嘔吐不思飲食

黃耆

北柴胡

當歸

醋炙各一兩

大腹皮

七不半

半夏

知母

苦梗

人參

赤茯苓

秦艽

赤芍藥

麥門冬

烏梅肉

各半兩

甘草

炙二不半

右為龕末每服四錢生薑三片水煎溫服

秦艽散 治心經有熱血脉凝滯五心煩倦

秦艽

麥門冬

各一兩

當歸

生地黃

各半兩

地骨皮

鬱金

蘇木

各二不半

右為細末每服一錢半水一盞紅花少許同煎至七分溫服若

冷勞氣滯血寒血凝者不可妄投

此方全在破血散結雖曰治冷勞然實為心腹積聚日久以致燠

瘁也大槩病根于冷而至干瘦故云然

若非真確豈敢妄用

此治肝脾血虛水鬱不達而發熱者最當引用門冬所以除五心之煩引用薄荷清肌骨之

得眠臥飲食全少

胡黃連散

治婦人熱勞體瘦經脈不通四肢疼痛口乾煩渴不

得眠臥飲食全少

胡黃連散

經脈調不用紅花忌酒與熱物此方可服一年此方以生地麥門涼血熱秦苳

地骨除骨熱其味皆治血脈凝滯之物也少加紅花以見生

血之功專忌酒熱以免助熱之累然非真鬱金不能服一年也

當用地黃湯

治熱勞手足煩心怔忡悸悶婦人血室有乾血身

體羸瘦不為肌肉

鱉甲醋炙熟地黃酒浸當歸柴胡白朮茯苓

麥門冬去心石斛秦苳各一兩人參肉桂不見火甘草炙

右剉每服四錢生薑四片烏梅半個水煎溫服

胡黃連散

治婦人熱勞體瘦經脈不通四肢疼痛口乾煩渴不

得眠臥飲食全少

鱉甲一兩半醋炙天靈蓋酥炙柴胡生地黃地骨皮

黃耆微炒犀角屑各一兩當歸胡黃連青蒿

大黃微炒犀角屑各一兩當歸胡黃連青蒿

黃耆微炒犀角屑各一兩當歸胡黃連青蒿

大黃微炒犀角屑各一兩當歸胡黃連青蒿

黃耆微炒犀角屑各一兩當歸胡黃連青蒿

大黃微炒犀角屑各一兩當歸胡黃連青蒿

黃耆微炒犀角屑各一兩當歸胡黃連青蒿

大黃微炒犀角屑各一兩當歸胡黃連青蒿

黃耆微炒犀角屑各一兩當歸胡黃連青蒿

熱一關表一

清裏其見不

同皆因病而

藥之也道遠

加法俱平正

亦可法全上

較前方少四

味而赤芍又

不同即可以

得其補瀉之

意矣以竹葉

小麥為引者

重在心肺之

意平芬散

此方較前黃

芪散無參芪

歸芪地骨而

加知母則于

升麻其重在

咽喉不利也

黃芩

各七錢半

赤芍藥

木香

麝香

細研各半兩

右為愈末每服四錢以水一中盞入生薑一錢三分桃柳心各

七莖煎至六分去滓不拘時溫服

犀角散 治婦人熱勞心胸煩熱不思飲食四肢多疼經脉澁滯

犀角屑

黃芩

甘草

炙各半兩

赤芍藥

虎杖

茯苓

地骨皮

麥門冬

去心

枳殼

微炒

當歸

各七錢半

柴胡

紅藍花

鱉甲

醋炙黃去裙各一兩

右為愈末每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓

溫服無時

紅藍花散 治婦人熱勞四肢羸瘦經脉不通

柴胡

一兩

紅藍花

當歸

生地黄

赤芍藥

然參芪有肺

熱還傷肺之

戒故不用而

知母射干又

瀉火動火使

赤宜思之若

少思飲食從

咽喉不利來

則可用從脾

胃不足來則

不可輕用臨

症自考病今

人以半夏天

腹之類性燥

為勞熱大忌

而古方乃以

半夏立名以

治熱勞豈非

異哉且日治

煩渴口乾尤

鬼箭羽

虎杖

大腹皮

麥門冬

去心

土瓜根

地骨皮

枳殼

麩炒各一兩

甘草

炙微赤半兩

右為釐散每服四錢以水一中盞人生薑半分煎至六分去滓

溫服無時

驚甲散

治婦人熱勞發渴壯熱四肢煩疼漸漸黃瘦心胸躁悶

驚甲

醋炙黃去裙襴

柴胡

各一兩半

麥門冬

去心一兩

知母

川大黃

炒

地骨皮

赤芍藥

黃耆

人參

黃芩

桑白皮

各七錢半

甘草

炙微赤半兩

右為釐散每服四錢以水一中盞人生薑半分葱白五寸豉五

十粒煎至六分去滓溫服無時

呵膠丸

治勞嗽出血咯血發熱晡熱口渴盜汗

如素荒可治

五味子炒雞蘇各一 梧子仁炒人參

防風

異也生薑如秦苑可治肢節之疼半夏可治瘰癧之嘔驚甲同柴胡以治寒熱烏梅同參麥以治口乾若大腹皮者又監制參芪之滯氣也雖異何疑轉而思之又慳夫今之不古者多矣全前此方以地黃當歸麥門以滋榮血脈以四君石斛以清胃補胆柴

阿膠炒

生地黄

卷栢葉

山藥炒

大薊根

五味子炒

雞蘇各

一栢子仁炒

人參

防風

麥門冬

去心各半兩

右爲末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼麥門冬煎湯下

猪肚丸

治婦人熱勞羸瘦

地柴胡

赤茯苓

人參

黃耆各一兩

黃連三兩

地骨皮

木香各半兩

桃仁去皮尖

驚甲各一兩半

右爲細末用好猪肚一枚淨洗將藥末入猪肚內以線縫合蒸

令爛熟於磁器內研如膏丸梧桐子大食前粥飲下三十丸午

食前再服

○治骨蒸勞瘵

胡驚甲秦究

以治骨蒸勞

加味四物湯 治婦人骨蒸

熱亦八物湯

當歸

白芍藥炒川芎

生地黃

地骨皮

之加減者然

牡丹皮

各等分

以肉桂為佐

右以咀每服六錢水煎服

我未敢信以

一方加白朮

為熱勞法也

黃連散

治婦人骨蒸勞熱四肢昏沉背膊疼痛面色痿黃漸漸

即以為法須

無力

黃連

去鬚

知母

各一兩

蟹甲

醋炙二兩

柴胡

木通

各一兩半

赤芍虎杖土

麥門冬

去心

白朮

各一兩

地骨皮

黃芩

犀角屑

各七錢半

瓜根皆破血

龍膽草

去蘆

甘草

炙微赤各半兩

通經腹皮枳

右為散每服四錢以水一中盞生薑一錢淡竹葉二七片煎

其他不過清

心涼血解熱

治婦人骨蒸勞熱四肢煩痛目漸高熱

按此四方大
同小異而柴
胡赤芍地骨
驚甲則當用
而參芪大黃
枳殼大腹之
類明互有去
取斷輪者自
有運斤之妙
臨症之際宜
審諸至望中
此方以四物
生四臟之陰
以地骨壯丹
解骨蒸之熱
其加白朮者
以土為萬物
之母也大意
如此
夫腎之餘氣

至六分去澤溫服無時

青蒿散。治婦人骨蒸勞熱四肢煩疼日漸羸熱。

青蒿

驚甲

醋炙各二兩

柴胡一兩

黃連去髮黃芩

桑白皮

白朮各雨

桐子仁

知母各七錢半地骨皮

甘草

炙各半兩龍膽草二錢半

右為麤散每服四錢以水一中盞人生薑一錢三分煎至六分

去滓溫服。

柴胡散。

治婦人骨蒸勞熱欬嗽胸膈痰壅腹脇妨悶不欲飲食

柴胡

桑白皮

麥門冬

去心

赤茯苓

各一雨

川大黃

剉碎微炒

枳殼

去穢炒

百合

秦羌

紫苑洗

黃芩

赤芍藥

知母

木通

各七錢半

半夏

湯洗七遍去滑

甘草

炙各半雨

驚甲

醋炙二兩

結而成骨心
火王燥久則
為蒸此方以
黃連木通犀
角麥門冬心
熱紫鑿龜骨
清骨熱知茶
救腎之母龍
胆瀉心知母
白木甘草和
諸藥而保脾
如是則壯火
水日旺而骨
蒸去矣又何
勞熱之有
前方有茶通
犀麥此方有
芪黃藥梔此
又何也然知
母龍胆所以
知母

右為麝散每服三錢以水一中盞入生薑一錢三分煎至六分

去滓溫服無時

河車丸 治勞嗽一切勞瘵虛損骨蒸等疾

紫河車 一枚初生男胎者尤良長流水中蕩洗
血淨入磁器內重湯煮極爛汁入藥 揀參一

白茯苓 雪白者 乾山藥 二兩

右為細末入河車汁加麵糊為丸如桐子大力少麝香末為衣
每服三五十丸米飲溫酒鹽湯任下空心服嗽甚者五味子湯

下

黃耆丸 治婦人骨蒸煩熱四肢羸瘦疼痛口乾心躁不得眠臥

黃耆 麥門冬 心茯神木 北柴胡 生地黄

甘草 各兩 酸棗仁 炒 郁李仁 枸杞子 杏仁 去皮尖 麝炒黃

以爲肺金之

知母

秦苑兩各半 饒留甲銀表一

清火之熱
來地知母所
以瀉肺金之
熱柴胡驚甲
青蒿解骨蒸
勞熱然肺渴
則氣傷于土
火去則土無
以生故用黃
芪白朮甘草
者所以發巨
橋之藥以保
赤子于干戈
之地也散
此方重在咳
嗽痰壅腹脇
妨悶上故用
大黃半夏然
大黃牛夏為
今人所宜登

人參去蘆

黃芩各七錢半 百合

穀去糠 赤芍藥

知母

秦艽

各半兩 驚甲製二兩

右為細末煉蜜丸桐子大清粥吞下三十丸無時

地黃煎丸解勞生肌進食活血養心

生地黄汁

杏仁汁

生薑汁

藕汁

各五升

薄荷汁

驚梨汁

各一升 法酒二升

炒蜜四升

右共合一處慢火熬成膏入後藥

北柴胡三兩 木香

人參

茯苓

栢子仁

去皮大所

山藥

遠志肉

枳實炒

白朮

各一

秦艽

苦梗

各二兩

麝香

半兩

熟地黄

洗焙酒蒸四兩

右為細末以前膏和丸如桐子大食後甘草湯下二三十丸

○治傳尸勞

天靈蓋散。治婦人傳尸骨蒸勞。四肢無力。每至晚間即熱。兩頰

紅色。飲食不下。心神煩躁。

天靈蓋酥炙安息香 地骨皮 當歸 人參去蘆

山梔子仁 貝母去心 黃連 桃仁去皮尖 檳榔各一兩

生乾地黄 驚甲醋炙 北柴胡 赤茯苓 蒸門冬各一錢半

阿魏半兩

右為籠末。每服四錢。以童子小便一大盞。桃柳枝各七寸。生薑

五片。葱白五寸。煎至七分。去滓溫服。

益母草丸。治婦人骨蒸勞瘦。月候不通。心神煩熱。四肢疼痛。不

能飲食。

古人之不如。今人歟。善用者當自得之。嗟乎。閱百人之方。我於今人之病。深有所慨焉。生熟散此方補氣益精。養血安神。清肺熱。寬胸膈。為主。而郁李杏仁。雖能潤燥。然大便滑者不宜。按骨蒸勞。未有不用柴胡。鑿者。而此方以諸汗熬膏。以潤肺除逆。消痰。為

以參木山

已上四味。劉綱用童子小便一斗。於銀鍋內煎至三升。絞去滓。

正外恐滿眼
損脾故又佐
以參朮山藥
茯苓射香之
類以疎啟中
氣而和子遠
志又所以養
脾之母而潤
心也如肌膚
滑濇而氣血
並虛者請嘗
試之何如地黃
傳尸者鬼崇
淹纏彼此傳
染相續而亡
其症亦大相
類然以為傳
尸有虫形變
不一大槩亦
是宿冤所伏

益母草 青蒿各一斤 桃枝 柳枝各一握

已上四味剉細用童子小便一斗於銀鍋內煎至三升絞去滓

煎成膏

柴胡 赤芍藥 犀角屑各一兩 鱉甲製二兩 桃仁製爭五兩

天靈蓋酥炙 硃砂細研水飛過 木香 甘草炙各二兩 麝香半兩細研

右為末用前膏和擣五七百杵丸如桐子大每服三十丸煎烏

梅甘草湯下無時

獼肝丸 治婦人骨蒸勞熱體瘦煩疼不欲飲食

獼肝具一 鱉甲醋炙 北柴胡各一兩半 川升麻 桃仁製

天靈蓋酥炙 犀角屑 梔子仁 地骨皮 知母各一兩

黃耆七錢半 甘草半兩 麝香二錢半研 硃砂一兩細研水飛

故多難治此方以天靈蓋祛伏尸安息香逐和崇阿魏換柳桃仁祛虫殺鬼其餘諸藥則補氣血清骨熱消痰而已別無所奇而其妙則在董使桃柳枝葱姜而已

此前方小異所此重在獵肝

此亦殺鬼祛虫藥也所謂鬼氣伏連非天靈蓋虎頭

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸溫水下無時

殺鬼方治婦人骨蒸傳尸勞瘵鬼氣伏連

麝香

七錢半

犀角屑

木香

白朮

鬼箭羽

各一兩

虎頭骨

酥炙黃色

天靈蓋

醋炙黃色

雄黃

另研

桃仁

去皮大剉炒黃

硃砂

光明者另研各一兩半

右爲細末入研藥和勻煉蜜丸如桐子大每服二十丸溫水

此藥辟溫疫亦可帶

○治血風勞

人參荊芥散

治婦人血風發熱身體疼痛頭昏目澁心忪煩倦

寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神不爽

人參

荊芥穗

左地黃

北柴胡

鱉甲

醋炙

病至於此生
 者少矣何復
 取一死人枕
 以結來生業
 寬也
 血風勞者若
 血虛肝熱生
 本而成勞者
 考內熱勞症
 其有外邪乘
 者又為外致
 之病當兩分
 有
 此方以十全
 大補去黃芪
 白芍而加荆
 芥防風蓋荆
 芥力行散肝
 中結血即火

酸棗仁 炒 枳殼 製 羚羊角 別 白朮 各七錢半 當歸

川芎 防風 桂心 甘草 各半兩

右為麓末每服五錢生薑三片水煎熱服

地骨皮散 治婦人血風氣體虛弱寒熱發渴

地骨皮 桑白皮 枳殼 前胡 黃蓍 各一錢半

人參 白茯苓 白芍藥 五加皮 各一錢 柴胡 二錢

官桂 甘草 各半錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

大效油煎散 治血風勞氣攻注四肢腰背疼痛嘔逆醋心不思

飲食日漸羸瘦面色痿黃手足麻痺血海冷敗神效

五加皮 川烏 炮 芍藥 梅桐皮 牡丹皮 各一兩

鬱發之義

而桂心之用

乃古方之常

當自斟酌

前方兼治心

此方兼治肺

而官桂之用

意非氣熱所

宜丁血風二

字不知將何

以解

此方以川烏

姜桂等藥為

主是裏治血

中有風也故

其出症皆風

之風冷攻注

等病也其煎

法以生麻油

浸錢豈非入

川芎

桂心

乾薑

各半兩

右為細末每服二錢水一盞生麻油浸錢一文同煎至六分溫

服常服以油浸二錢煎藥時不可攪吃藥時不可吹

治血風勞方

荆芥穗

二兩

白芍藥

牡丹皮

防風

地骨皮

白芷

黑豆

甘草

各一兩

川芎

二錢半

右為細末每服二錢水一中盞姜三片棗一個葱白一寸煎至

八分溫服無時

萬全逍遙散治血風勞五心煩躁心多怔忡恍惚憂懼頭目昏

重夜多盜汗

人參

黃耆

白朮

白茯苓

去皮

柴胡

去土各等分

吃不可吹又熟乾地黃散治婦人血風勞冷氣攻心心腹疼痛四肢不和欲

法以生麻油

人參

黃芩

白朮

白茯苓 法柴胡 去甘冬

肝潤燥飲片
謂前藥可挽

吃不可吹又
不知其深意

也
此又治在風

熱清而血自
旺也可為良

法第恐人不
自悟耳

既治血風何
為盡用氣藥

况以氣藥而
欲治以下諸

症似亦不能
愚謂此方非

治血風勞乃
治氣虛症也

用者審之
既治冷氣當

右為散每服三錢人甘草一寸同煎溫服

熟乾地黄散 治婦人血風勞冷氣攻心心腹疼痛四肢不和欲

食減少日漸羸瘦

熟乾地黄 柴胡 黃耆 蒼朮 牛膝各一兩

鱉甲醋炙黃二兩 白芍藥 當歸 薑黃 琥珀

厚朴薑汁塗炙 川芎 陳皮去白各七錢半 木香 羌活

桂心各半兩

右為散每服四錢加生薑半分水煎熟服

同前方入無
熱虛各條內
然以風名而
有風藥以冷
名而有熱藥
以勞名而有
治勞藥以血
藥補血散血
以氣藥補氣
行氣用平胃
以和脾胃而
除心腹之疼
用菴桂以通
經而除四肢
之病蓋以錯
雜之邪而用
錯雜之藥今
之所謂良醫
概如此

濟陰綱目卷之四終

濟陰綱目

卷四

三十三

吳興、金德生聞風父輯著 錢塘 查學淳用拙父訂正

概如此

濟陰綱目卷之四

濟陰綱目卷之五

吳興 金德生聞風父輯著 錢塘 查學淳用拙父訂正

西陵 汪 淇慎齋子箋釋 天都 查 望于周父叅閱

○積聚癥瘕

○論婦人諸積形狀

外有腸覃石
癥瘕瘕三症
亦當與此條
參看
按七門之中
而瘕有八其
疝氣或聚或
散瘕瘕之與
痛俱見不痛
則隱亦可與
瘕並稱則八
瘕之外又有
三積矣又男

準繩云。大全良方分瘕瘕。諸氣疝瘕。八瘕。腹中瘕。血瘕。痞食瘕。血瘕。凡七門。瘕者在腹內。近臍左右。各有一條筋脈急痛。大者如臂。次者如指。因氣而成。如弦之狀。故名曰瘕。瘕者。僻在兩肋之間。有時而痛。故名曰瘕。疝者。痛也。瘕者。假也。其結聚浮假而痛。推移乃動也。八瘕者。黃瘕。青瘕。燥瘕。血瘕。脂瘕。狐瘕。蛇瘕。鼈瘕。積在腹內。或腸胃之間。與臟氣結搏堅牢。雖推之不移。名曰瘕。言其病形可

子為七疝。女為瘕。則疝與瘕亦可同經。男與女亦有同病。是瘕不止于八也。瘕一瘕。二曰血。曰食。而不言及痰飲何也。蓋瘕氣之中。未嘗無飲。而血瘕含藏之內。未嘗無痰。則痰食血。又未有不先因氣而瘕病也。故消積之中。當兼行氣消痰。消瘕之藥。為是。

徵驗也。氣壅塞為瘕。言其氣痞塞不宜暢也。傷食成塊。堅而不移。名曰食瘕。瘀血成塊。堅而不移。名曰血瘕。若夫腹中瘀血。則積而未堅。未至於成塊者也。大抵以推之不動為瘕。推之動為瘕也。至夫疝與瘕。瘕則與痛俱。痛即現。不痛即隱。在臍左右為瘕。在兩肋之間為瘕。在小腹而牽引腰脇為瘕。恐學者一時難了。未免淆亂。故總叙而條析之。

論婦人八瘕所因

病源曰。八瘕者。皆胞胎生產月水往來。血脈精氣不調之所生也。腎為陰主開閉。左為胞門。右為子戶。主定月水生子之道。胞門子戶。主子精神氣所出入。合於中黃門。玉門四邊主持開元。禁閉子精。臍下二寸。名曰開元。主臟魂魄婦人之胞。三焦之府。常所從止。

榮衛經絡斷絕不通。邪氣便得往來。入合於臍。若生血未盡而合。

然婦人經脈俞絡合調則月水以時來至故能生子而無病婦人榮衛經絡斷絕不通邪氣便得往來入合於臟若生血未盡而合陰陽即使婦人血脈攣急小腹重急支滿胸脇腰背相引四肢痠痛飲食不調結牢惡血不除月水不時或月前月後因生積聚如懷胎狀邪氣甚盛者令人恍惚多夢寒熱四肢不欲動陰中生氣腫內生風甚者小便不利苦痛如淋狀面目黃黑歲月久即不復生子也

黃瘕者婦人月水始下若新傷墮血氣未止臥寢未定五臟六腑虛羸精神不足因向大風便利陰陽開闔關節四邊中於風濕氣從下上入於陰中稽留不去名爲陰虛則生黃瘕黃瘕之聚令人苦四肢寒熱身重淋露臥不欲食左脇下有氣結牢不可得抑若

腰背相引痛。月水不利。令人不產。小腹急下引陰中如刺。不得小便。或時寒熱下赤黃汁。令人無子。當刺開元氣。衡行以毒藥。痕下即愈。

青痕者。婦人新產未滿十日起行。以浣洗太早。陰陽虛。玉門四邊皆解散。子戶未安。骨肉皆痛。手臂不舉。飲食未復。內臟吸吸。又當風臥。不自隱蔽。若居濕席。令人苦寒。洒洒入腹。煩悶沉淖。惡血不除。結熱不得散。則生青痕。聚在左右脇下。藏於背脊上。與肩脾腰下。變急。腹下有氣起。喜唾。不可多食。四肢不欲動搖。手足腫。面目黃。大小便難。其後月水爲之不通利。或不復禁。狀如崩中。此自過所致。令人少子。療之當刺胃管。行以毒藥。有法。痕當下即愈。

燥瘕者。婦人月水下。惡血未盡。其人虛憊。而以夏月執行疾步。若

脈壅急。內結不舒。煩滿。少力。氣上達胸膈。皆自少腹壅急。月水阻。

舉重移輕汗出交流。氣血未平而卒以恚怒。致腹中猥咽不洩。經脈攣急。內結不舒。煩懣少力。氣上達。胸膈皆替。少腹壅急。月水與氣俱不通利。而反以飲清快心。月水橫流。溢入他臟。不去。有熱則生燥。瘕之聚。大如半杯。上下腹中苦痛。連兩脇。下上引心而煩。害飲食。欲嘔吐。胸及腹中不得太息。腰背重。喜臥盜汗。足痠。前久立而痛。小便失時。忽然自出。若失精。月水閉塞。大便澁難。病如此者。其人少子。療之以長鍼。按而刺之。法度行。以毒藥。瘕當下即愈。血瘕者。婦人月水新下。未滿日數而中止。因飲食過度。五穀氣盛。溢入他臟。若大饑寒。呼吸不足。呼吸未調。而自勞動。血下未定。左右走。腸胃之間。留絡不去。內有寒熱。與月水合。會為血瘕之聚。令腰痛不可俛仰。橫骨下有積氣。牢如石。小腹裏急。若痛。皆瘕。深

達腰腹。下攣陰裏。若生風冷。子門僻。月水不時。乍來乍不來。此病令人無子。療之。痕當下卽愈。

脂痕者。婦人月水新來。若生未滿三十日。以合陰陽絡脈分胞門。傷子戶。失禁。關節散。五臟六腑津液流行。陰道潤動。百脈關樞四解。外不見其形。子精與血氣相遇。犯禁。子精化不足成子。則爲脂痕之聚。令人支滿裏急。痺引少腹重。腰背如刺狀。四肢不舉。飲食不甘。臥不安席。左右走腹中切痛。時瘥時甚。或時少氣頭眩。身體解。仿若寒惡風。膀胱脹。月水乍來乍去。不如當度。大小便血不止。如此者。令人無子。療之。當刺以長鍼。行以毒藥。痕當下卽愈。

狐痕者。婦人月水當日數來。而反悲哀憂恐。若似遠行逢暴風疾。而雷電驚恐。衣被沉濕。罷倦少氣。心中恍惚未定。四肢懈情。隤穴

子臟。令人月水閉不通。小腹痠痛。胸膈腰背痛。陰中腫小。便難。胞

苦寤寐氣絕精神游亡邪氣入於陰裏不去則生狐瘕之聚食人子臟令人月水閉不通少腹瘀滯胸膈腰背痛陰中腫小便難胞門子戶不受男精不藏氣盛令人嗜食欲嘔喜唾多所思如有身狀四肢不舉本此病者終身無子其瘕有手足成形者殺人未成者可療以長鍼急持刺之行以毒藥有法瘕當下即愈蛇瘕者婦人月水已下新至適閉未復胞門子戶勞傷陰陽未平榮衛分行若其中風暴病羸劣飲食未調若起行當風及涉泥塗因衝寒太早若坐濕地名陰陽亂腹中虛若遠行道路飲汚井之水食不潔之食蚕蛇虱之精留絡不去因生蛇瘕之聚上食心肝長大其形如棗在臍上下還疔左右脇不得吐氣兩股脛間苦疼少腹多熱小便赤黃膀胱引陰中攣急腰背俱痛難以動作喜發

寒熱。月水或多或少。有此病者。不復生子。其瘕手足成形者。殺人。未成者可治。療之有法。行以毒藥。瘕當下卽愈。

鼈瘕者。婦人月水新至。其人劇作罷勞。汗出衣服潤濕。不以時去之。若當風睡。足踐濕地。恍惚覺悟。蹠立未安。顏色未平。復見所好。心爲之開。魂魄感動。五內脫消。若入水浣洗沐浴。不以時出。而神不守。水精與邪氣俱入。至三焦之中。幕玉門先閉。津液妄行。留絡不去。因生鼈瘕之聚。大如小杵。令人小腹內切痛。惡氣左右走上。下腹中苦痛。若存若亡。持之躍手。下引陰裏。腰背亦痛。不可以息。月水不通。面目黃黑。脫聲少氣。有此病者。令人絕子。其瘕有手足成形者。殺人。未成者可治。療有法度。以長針按療之。行以毒藥。瘕當下卽愈。

患

薛氏之說可
為病久虛羸
者法

○論婦人癥痞

大全云。婦人癥痞。由飲食失節。脾胃虧損。邪正相搏。積於腹中。牢
固不動。有可徵驗。故名曰癥。氣道壅塞。故名曰痞。得冷則發。冷入
子臟。則不孕。入胞絡。則月水不通。

薛氏曰。前證若脾胃虛弱。用六君子加芎歸。若肝脾虛弱。用補中
益氣。及歸脾湯。若肝火鬱滯。佐以蘆薈丸。六味丸。外貼阿魏膏。患
者須慎七情六淫。飲食起居。泊者不時審察病機。而藥之。庶幾有
效。

○論食癥

大全云。婦人食癥。臟腑虛弱。月候來時。食生冷之物。脾胃既虛。不
能消化。與臟氣相搏。結聚成塊。日漸生。長盤牢不移。故謂之食癥。

也。

薛氏曰。前證若形氣弱。須先調補脾胃為主。而佐以消導。若形氣見實。當先疏導為主。而佐以補脾胃。若氣壅血滯而不行者。宜用烏藥散。散而行之。散用烏藥。莪朮。醋浸炒。桂心。當歸。桃仁。青皮。木香。各等分。為末。每二錢。熱酒送下。脾氣虛而血不行者。宜用四君。芎歸補而行之。若脾氣鬱血不行者。宜用歸脾湯解而行之。若肝脾血燥而不行者。宜用加味消遙散。結而行之。大抵食積痞塊之證。為有形。蓋邪氣勝則實。真氣奪則虛。當養正闢邪而積自除矣。雖然。堅者削之。客者除之。胃氣未虛。或可宜用。若病久虛弱者。不可輕試也。

○論血癥

大全云。婦人寒熱失節。臟腑氣虛。風冷在內。飲食不消。與血氣相

痞塞。惡血不除。結聚所生。久而不瘥。則心腹兩脇苦痛。青於飲食。

有以左畔為
血癥者凡肝
之部皆可為
血病

結漸生。顛。壅。盤。牢。不。移。動。者。是。也。皆。因。血。氣。勞。傷。月。水。往。來。經。絡。
痞。塞。惡。血。不。除。結。聚。所。生。久。而。不。瘥。則。心。腹。兩。脇。苦。痛。害。於。飲。食。
肌。膚。羸。瘦。

問。癥。一。也。何。以。知。是。血。癥。曰。血。外。之。証。腎。悶。煩。燥。迷。忘。驚。狂。痰。嘔。
汗。多。骨。熱。肢。冷。其。畜。在。下。焦。者。必。臍。下。結。急。外。熱。內。痛。尺。脈。洪。而。
數。也。桃。仁。靈。脂。生。地。黃。牛。膝。大。黃。甘。草。祛。逐。之。

薛氏曰。前証多兼七情虧損。五臟氣血乖違。而致。蓋氣主噓之。血
主濡之。脾統血。肝藏血。故鬱結傷脾。悲怒傷肝者。多患之。腹脇作
痛。正屬肝脾二經証也。潔古曰。養正積自除。東垣云。人以胃氣為
主。治法當主於固元氣。而佐以攻伐之劑。必需之歲月。若期速效。
投以峻劑。反致有悞。

論腹中瘀血

大全云。婦人月經否塞不通。或產後餘穢未盡。因而乘風取涼。爲風冷所乘。血得冷則成瘀血也。血瘀在內。則時時體熱面黃。瘀久不消。則爲積聚癥瘕矣。

薛氏曰。前証若鬱結傷脾。用加味歸脾湯。若恚怒傷肝。用加味逍遙散。若產後惡露用失笑散。若肝脾虛損。用六君子。柴胡以補元氣爲主。胃氣虛弱。用補中益氣湯。加茯苓。生夏爲主。大凡腹中作痛。畏手按者。此內有瘀血。若形體如常。屬病氣。元氣俱實。用桃仁承氣湯直下之。若痛而肢體倦怠。飲食少思。此脾胃受傷。屬病氣有餘。元氣不足。用當歸散調和之。若痛而喜手按腹。形體倦怠。飲食少思。此形氣病氣俱不足。用六君炮薑。歸純補之。若痛而大

胃故其言如此然亦一偏之見復攻削之藥不得其竅反致傷氣以致不救故不如善守之為愈矣

便不實。飲食難化。此脾腎虛寒。用六君炮薑肉果溫香之。若痛而作嘔。少食。此脾胃虛弱。用六君炮薑藿香。若痛而嘔吐。不食泄瀉。用六君薑桂。若兼手足逆冷自汗。更加附子。此証多有因攻伐而致者。

○論疝癖

大全云。疝者在腹內近臍左右。各有一條筋脈急痛。大者如臂。次者如指。因氣而成。如弦之狀。名曰疝也。癖者為僻。側在兩肋之間。有時而痛。故曰癖也。二者皆陰陽不和。經絡痞隔。飲食停滯。不得宣流。邪冷之氣。搏結不散。得冷則發作疼痛。夫疝癖癥瘕血氣塊硬。發作則痛。甚則欲死。究而言之。皆血之所為。僕嘗治一婦人血氣刺痛。極不可忍。甚而死一二日方省。醫巫併治數年不愈。僕

以葱白散烏雞丸遂安。又嘗治一婦人血氣作楚如一小盤樣走注刺痛。要一人扶定方少止。亦用此二藥而愈。尋常小小血氣用此二藥亦有奇効。故錄於後。

○論疝瘕

大全云。婦人疝瘕。由飲食不節。寒溫不調。氣血勞傷。臟腑虛弱。風冷入腹。與血相結。所生疝者。痛也。瘕者。假也。結聚浮假而痛。推移乃動也。婦人之病。有異於丈夫者。或因產後血虛受寒。或因經水往來取冷過度。非獨因飲食失節。多挾瘀血。氣所成也。其脈弦急者。生虛弱小者。死。尺脈澀而浮牢。為血實氣虛。其發腹痛。逆氣上行。此為胞中有惡血。久則結成血瘕也。

巢氏止言胞門傷而此直指胞中惡血亦本病源來

薛氏曰。子和云。遺溺閉癰。陰痿浮痺。精滑白濁。皆男子之疝也。若

女子之疝也。但女子不謂之疝。而謂之瘕。

女子亦有癰
男子亦有癰

薛氏曰：子和云：遺精閉經，陰虛發熱，結精，白帶，自女子之病也。血涸月事不行，行後小腹有塊，或時動移，前陰突出，後陰痔核，皆女子之病也。但女子不謂之癰，而謂之瘕。

一婦人小腹痞脹，小便時下白帶，小水淋瀝，此肝經濕熱下注，用龍膽瀉肝湯而愈。

一婦人小腹脹痛，小水不利，或胸乳作痛，或脇肋作脹，或氣逆心吻，余以為肝火而血傷脾，用四物、柴胡、青皮、玄胡、索木香而愈。

一婦人小腹痞悶，小便不利，內熱體倦，懶食，用八珍湯加柴胡、山梔、龍膽草治之而安。

○論腸覃

李氏曰：腸覃乃寒氣客於大腸，與胃相搏，大腸為肺傳送，肺主氣，氣得熱則行，得冷則凝，凝則清氣散而濁氣結為瘕，覃延日久不

已。瘕。肉。乃。生。始。如。雞。卵。久。如。懷。胎。按。之。堅。推。之。移。月。事。時。下。或。多。或。少。氣。病。而。血。未。病。也。宜。二。陳。湯。加。香。附。以。開。之。或。香。粉。丸。

瘕瘕積聚並
起于氣故有
氣積氣聚之
說然諸瘕屬
血病者氣聚
而後血凝也
其夾食夾痰
又各隨所積
而變見矣夫
痰與血食皆
賴氣以為之
行化故氣行
物生氣病物
病此百病所
以皆生于氣
而痰血消痰

○論婦人瘕瘕並屬血病
準繩云古方有五積六聚七瘕八瘕之名五臟之氣積名曰積故
積有五六府之氣聚名曰聚故聚有六雜病準繩言之詳矣若夫
七瘕八瘕則婦人居多七者火數屬心蓋血生於心八者木數屬
肝蓋血歸於肝雖曰強分理似不混夫瘕者堅也堅則難破瘕者
假也假物成形古人將婦人病為瘕疾以蛟龍等為生瘕然亦不
必如此執泥婦人瘕瘕並屬血病龍蛇魚鱉肉髮蟲瘕等事皆出
偶然但飲食間誤中之留聚腹臆假血而成自有活性亦猶永微
中僧病噎著腹中有一物其狀如魚即生瘕也與夫宿血停凝結

消食之劑必用氣藥若以敗梳敗篋同用益取義耳未必盡善

爲痞塊雖內所感之不同治法當以類相從所謂醫者意也如以敗梳治蠱瘕銅屑治龍瘕麴蘖治米瘕石灰治酒瘕如此等類學者可以理解也

○論治積須養正氣

薛新甫云婦人疝瘕瘕瘕大抵因飲食起居七情失宜虧損臟腑氣血乖違陰絡受傷循行失度所致

羅謙甫云養正積自除必先調養使榮衛充實若不消散方可議下但除之不以漸則必有顛覆之害若不守禁忌縱情嗜慾其有不喪者鮮矣

非鬱結之脈而謂鬱之症何欤

一婦人內熱作渴飲食少思腹內初加雞卵漸大四寸許經水三月一至肢體消瘦齒頰似蒼脉洪數而虛左關尤甚此肝脾鬱結

以能治癰結
意取營氣外
散也

盧薈丸治肝
陰之結

之証。外貼阿魏膏。午前用補中益氣湯。午後用加味歸脾湯。兩月
許。肝火稍退。脾土少健。午前補中益氣湯。六味丸。午後逍遙散。下
歸脾丸。又月餘。日用盧薈丸二服。空心以逍遙散下。日晡以歸脾
湯下。喜其謹疾。調理年餘而愈。

一婦人腹內一塊。不時上攻。或作痛有聲。或吞酸痞悶。月經不調。
小便不利。二年餘矣。面色青黃。余以爲肝脾氣滯。以六君加芎歸。
柴胡炒連木香吳茱各少許二劑。却與歸脾湯送下。盧薈丸三月。
餘。肝脾和而諸証退。又與調中益氣湯加茯苓牡丹皮。中氣健而
經自調。

一婦人性多鬱善怒。勤於女工。小腹內結一塊。或作痛或痞悶。月
經不調。多服伐肝之劑。內熱寒熱。胸膈不利。飲食不甘。形体日瘦。

牙齦蝕爛。此脾土不能生肺金。肺金不能生腎水。腎水不能生肝木。當滋化源。用補中益氣湯六味丸。至仲春而愈。

一婦人經候過期。發熱倦怠。或用四物黃連之類。及兩月一度。且少而成塊。又用峻藥通之。兩目如帛所蔽。余曰。帛為諸陰之首。目為血脈之宗。此脾傷五臟皆為失所。不能歸於目也。遂用補中益氣。濟生歸脾二湯。專主脾胃。年餘而愈。

松江太守何恭。人性善怒。腹結一塊。年餘上齧蝕透。血氣虛極。時季冬。肝脉洪。數按之弦緊。或用伐肝木清胃火之藥。余曰。真氣虛而邪氣實也。恐伐肝木。至春不能發生耳。用八珍湯以生氣血。用地黃丸以滋腎水。肝脉頓退。因大怒。耳內出血。肝脉仍大。煩熱作渴。此無根之火也。仍以前藥加肉桂二劑。脉欲熱退。復因大怒。果

歷觀數案。皆以肝脾腎為主。而愈者在立齋則可。在他處則不可。

至論

卒於季冬辛巳日乃金尅木故也。

李氏曰善治癥瘕者調其氣而破其血消其食而豁其痰衰其大半而止不可猛攻峻施以傷元氣寧扶脾胃正氣待其自化此開鬱正元散之由名也愈後宜大小烏雞丸八珍湯交加散交加地黃丸調之凡攻擊之藥病重病受病輕胃氣受之而傷矣或云待塊消盡而後補養則胃氣之存也幾希。

○論痰積用吐下。

曰子和云戴人過難遇一卒說出毒事戴人問其故答曰吾婦爲室女時心下有冷積如覆杯按之如水聲以熱手熨之如冰娶來已十五年矣恐斷我嗣是故棄之戴人曰公勿黜也如用我藥病可除孕可得卒從之戴人診其脉沉而遲尺脉洪大而有九非無子

知脉病相同
故病可除子
可得

心下平軟次服白朮調中湯五苓散後以四物湯和之不再月氣

故病可除子

除孕可得孕從之載人診其脈沉而遲尺脈洪大而有孕非無子

之候也。可不踰年而孕。其良人笑曰。試之。先以三聖散吐涎一斗。心下平軟。次服白朮調中湯。五苓散。後以四物湯和之下。再月氣血合度。數月而娠。三子。戴人嘗曰。用吾此法。無不子之婦。此言不誣。三聖散用防風瓜蒂各三兩。蒙蘆一兩。為粗末。以薺汁煎服。製煎法詳見儒門事親。白朮調中湯。北白朮。茯苓。澤瀉。橘紅。各半兩。甘草一兩。乾薑。官桂。砂仁。藿香。各二錢。牛為末。白湯化蜜調服。二錢。無時。

魚腥黃涎能
治濕熱
用法痛快

陽夏張主簿之妻。病肥氣。初如酒杯。大發寒熱。十五餘年後。因性急。悲感。病益甚。惟心下三指許。無病。滿腹如石片。不能坐臥。針灸匝矣。徒勞人耳。乃邀戴人診之。曰。此肥氣也。得之季夏戊巳日。在左脇下。如覆杯。久不瘳。令人發癢癢。瓜蒂散吐之。魚腥黃涎。約一二缶。至夜。繼用舟車丸。通經散。投之。五更黃涎。膿水相半。五六行。凡有積處。皆覺痛。後用白朮散。當歸散。和血流經之藥。如斯湧泄。

宜熱調

按此諸藥方
治氣血痰食
平和之劑海
粉不入煮若
作丸更佳

丹三次瘡

瓜蒂散舟車丸方見雜病傷食痰飲二門。通經散用
橘紅當歸甘遂以麩包不令透水煮百餘沸用冷水浸
過去麩晒乾三味各等分爲細末每服三錢臨臥溫淡酒謝下。
白朮散白朮黃芩當歸各等分爲末每服二三錢水煎食前服。
當歸散當歸杜蘅藜等分爲末米飲調服食前。
此吐下兼施且甘遂等逐水太峻用者審之。

脈法

脈經曰婦人疝瘕積聚脈弦急者生虛弱者死。少陰脈浮而緊
緊則疝瘕腹中痛。半產而墮傷浮則亡血惡寒絕產。

通治諸積

開鬱正元散

治痰飲血氣鬱結食積氣不升降積聚腹痛宜此

利氣行血和脾消導

白朮

陳皮

青皮

香附

山楂

海粉

桔梗

茯苓

砂仁

玄胡索

神麴

炒

麥芽

甘草

炙各等分

大七氣湯

治積聚癥瘕隨氣上下心腹疝痛上氣望壘小腹脹

此惟病氣形
氣傷者可
用總重在隨
氣上下句若
氣鬱生火者
忌之

此方削堅積
破滯氣雖用
白水為佐而
氣虛者不可
輕服

右劉每服一兩生薑三片水煎服

大七氣湯 治積聚癥瘕隨氣上下心腹疔痛上氣窒塞小腹脹

滿大小便不利

京三稜

蓬朮

各煨

青皮

去白

陳皮

去白

香附

炒

藿香葉

益智仁

桔梗

肉桂

不見火

甘草

炙七錢半

右吹阻每服五錢水二盞煎至一盞食前溫服

助氣丸 治三焦痞閉胸膈滿悶氣不流通蘊結成積痞癖氣塊

並皆治之

京三稜

蓬朮

已土二味各用油細包炭火中煨透切片各二斤

青皮

去白

陳皮

去白

白朮

各十兩

枳殼

麩炒去穢

檳榔

木香

各十兩

右為末糊丸桐子大每服五十丸滾水下

若寒氣實者
可用

用藥巧處

土在氣行血
流痰消食消
也妙在用醋
之多

勝紅丸 治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水丈夫酒積

女人脾血積小兒食積

京三稜

莪朮 二味同醋煮

青皮

陳皮

乾薑 炮

良薑

炒各二兩

香附子

淨炒三兩

右為末醋糊丸如桐子大每服三十丸生薑湯下○虛者以補

藥下之○一方加神曲麥芽

三稜煎 治婦人血瘕血癥食積痰滯

三稜

莪朮 各一兩

青皮 去白

半夏

湯炮七次

麥芽

炒各二兩

右用好醋六升煮乾為末醋糊丸如桐子大每服五十丸淡醋

湯下○痰積薑湯下

香稜丸

治一切積聚破痰癖消癥塊

此溫行之法
峻而不猛行
而得妙在
用醋

丸消塊俱用
執藥行氣削
堅之劑而此
方又以補中
帶消頂千金
方也用者式
之

木香 丁香 各半兩

枳殼 炒

三稜 酒浸一夕

莪茂 細剉每兩用巴豆

三十粒去殼同炒待巴豆黃色去巴豆不用

青皮 製

川棟子肉

藁香 炒各等分

右為末醋煮麵糊丸如桐子大朱砂為衣每服三十丸薑鹽湯

或溫酒下無時

大硝石丸 治七癥八瘕聚結痞塊及婦人帶下絕產腹中有癥

瘕者常先下此藥但去癥瘕令人不困

硝石 三兩

大黃 四兩

人參

甘草 各一兩

右為末以三年苦酒三升置銅石器中先用大黃微火熬微沸

常攪不息至七分內餘藥復熬成膏至可丸即丸如桐子大每

服三十丸米飲下三日一服婦人服之或下如雞肝或如米汁

赤黑等物二三升後忌風冷

阿魏膏 治一切瘡塊

羌活 獨活 玄參 官桂 赤芍藥 川山甲 生地黃

兩頭尖 大黃 白芷 天麻 紅花 木鼈子

去殼 槐柳桃枝 各三錢 亂髮 雞子大一團

右用香油二觔四兩煎黑去渣入髮煎髮化仍去渣徐去黃丹

煎軟硬得中入芒硝阿魏蘇合油乳香沒藥各五錢麝香三錢

調勻即成膏矣攤貼患處鋪平半指厚以紙蓋用熱熨斗熨良

久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥

○分治八痕

八痕之由皆 皂莢散 療黃痕導方

白胞門子戶 感受故用此

皂莢 一兩炙 蜀椒 一兩 細辛 一兩

已則復刺之惡血畢出乃洗以溫湯三日勿近男子忌生菜等

方以導之

右搗散以三角囊大如指長二寸貯之內陰中欲便悶則出之已則復內之惡血畢出乃洗以溫湯三日勿近男子忌生菜等

療青痕坐蓐方

戎鹽

一光同

皂莢

半兩去皮子炙

細辛

一兩

右搗散以三角囊大如指長三寸貯之內陰中但卧痕當不清如葵汁養之如產法

療燥痕方

大黃

如雞子許

乾薑

各三兩

黃連

三兩

桂心

一兩

厚朴

四兩炙

郁李仁

一兩去皮尖炒

廬蟲

三枚炒

雞臙脰中黃膜

一枚炙

右搗散早朝空腹以溫酒一盞和三錢頓服痕當下畢養之如產法三月勿合陰陽無子者當

香脂即油
脂

療血瘕攻刺腹脇時痛導藥方

大黃

當歸各半兩

山茱萸

皂莢

去皮弦各一兩

細辛

戎鹽

各二錢半

右搗以香脂丸如指大每用一丸綿裹內陰中正坐良久瘕當自下養如乳婦法

療婦人血瘕痛方

乾薑

烏鰂魚骨

炙各一兩

桃仁

一兩去皮尖

右搗散酒服二方寸七日二方無桃仁

桃仁煎治婦人血瘕血積經候不通

桃仁

大黃

各一兩

燕蟲

半兩炒黑

朴硝

另研二兩

右為末以醇醋二升半銀石器中慢火煎取一升五合下大黃燕蟲桃仁不住手攪煎至可丸下朴硝攪勻出之丸如梧桐子

赤豆泔或如雞肝蝦蟆衣之狀未下再服如鮮血來即止續以

可怪

療脂瘕方

太前一日不用喫晚飯。五更初用溫酒吞下五丸。日午取下如赤豆汁。或如雞肝蝦蟆衣之狀。未下再服。如鮮血來即止。續以調補氣血藥補之。○本事方云。頃年在毗陵。有一貴宦妻患小便不通。臍腹脹不可忍。眾醫皆作淋治。以八正散之劑。愈甚。予診之曰。此血瘕也。非眩眩藥不可去。用此藥更初服。至日午大痛不可忍。遂臥少頃。下血塊如拳者數枚。小便如黑豆汁。一二升。痛止得愈。○此藥治病的切。然猛烈。氣虛血弱者不可輕用。

皂莢 七錢半 去皮子

礬石 燒二錢半

五味子

蜀椒 去汗

細辛 乾薑 各半兩

右搗散。以香脂和如大豆。著男子陰頭。以合陰陽。不三行其瘕。

即愈

導散方

皂莢炙去子 吳茱萸 當歸各一兩 蜀椒去汗 乾薑

大黃 戎鹽各二兩 細辛炒 礬石燒 五味子各二錢

右搗篩為散。以輕絹袋如指大長三寸盛藥。令滿。內陰中。坐臥隨意。勿行走。小便時去之。別換新者。

療狐瘻方

取新死鼠一枚。裹以新絮。塗以黃土。穿地坎。足沒鼠形。置其中。桑柴火灼其上。一日一夜出之。研為末。肉桂心末二錢。半酒服二方寸匕。病當下。甚者。不過再服愈。

療蛇瘻方

鳥鰾魚骨二枚

皂莢六枚 去皮

大黃

黃芩

芒硝

各半兩

甘草

大如指一尺炙

烏鰂魚骨

二枚

皂莢

六枚去皮弦子耐炙

右搗以水六升煮之三數沸絞去滓下硝適寒溫服之十日一

劑空腹服之瘰癧當下

療鼈瘰癧方

大黃

一兩五錢

乾薑

側子

各半兩

附子

人參

各三錢七分半

蜜蠱

七寸

桂心

一兩二錢半

細辛

土鱖

各七錢半

白朮

一兩

右搗散以酒服方寸七日三

治癰瘰

穿山甲散

治婦人癰瘰及惡血氣攻心腹疼痛面無顏色四肢

瘦弱

此方散結破血行氣消飲溫行損塊要藥也

此方破結氣散結血軟堅溫利亦可備用

猛峻之丸不可妄試

穿山甲

灰炒燥

鼈甲

醋炙

赤芍藥

大黃

炒

乾漆

炒令烟盡

桂心

各兩

川芎

芫花

醋炒

當歸

各半兩

麝香

二錢半另可

右為細末

入麝和勻每服一錢熱酒調下

蓬莪茂丸

治婦人癥瘕腹脇妨痛令人體瘦不思飲食

莪茂

七錢半

當歸

焙

桂心

赤芍藥

檳榔

昆布

琥珀

研

枳殼

木香

各半兩

桃仁

鼈甲

大黃

各一兩

右為末

煉密丸如桐子大食前米飲下二十丸

丁香丸

治婦人癥瘕結塊不散心腹疼痛

雄雀糞

炒黃

鼈甲

各一兩

礞砂

當歸

焙

芫花

醋炒乾

巴豆

去皮心油二分半

右為末

研勻醋煮麵糊丸如小豆大當歸酒不三丸

桃仁仁一兩湯浸去皮尖雙

訶子皮

白朮

赤芍藥

右爲未研勻醋者麵糊丸如小豆大當歸酒不二九

桃仁散 治婦人癥瘕心腹脹滿不能飲食體瘦無力

桃仁 一兩湯浸去皮尖雙仁者麵炒令微黃 訶子皮 白朮 赤芍藥

當歸 各七錢半 京三稜 微炒一兩 陳皮 去白三兩 鼈甲 醋炙去召一兩半

右爲散每服三錢水一盞人生薑一錢三分煎至六分去滓食前稍熱服右方皆攻積之藥性多獷悍用者慎之

○治食癥

化積丸 治婦人死血食積痰飲成塊在兩脇動作雷鳴嘈雜眩暈身熱時作時止

黃連 一兩五錢用吳茱萸益智各炒一半去英智

蘿蔔子 香附 山楂 各一兩

川芎 山梔 炒 三稜 煨切 神麴 炒 桃仁 去皮尖各五錢

右爲末蒸餅丸服

此丹溪先生法也緣古方辛多香燥溫熱反能助火損氣此方以茱萸製連而治左以益智製連而治右以山梔治塊

中之火其餘
破氣消食散
血誠穩當藥
也

行氣消飲磨
積

小三稜煎丸

治食癥酒癖血瘕氣塊時發刺痛全不思食及一

切積滯不消心腹堅脹痰飲嘔噦噫酸脇肋刺痛脾氣橫泄

三稜

莪朮

各四兩

芫花一兩

右同入磁器中用米醋五升浸滿封器口以灰火煨令乾取出

稜木將芫花以餘醋炒令微焦同稜木焙乾為末醋糊丸如菜

豆大一服十五丸生薑湯下婦人血分男子脾氣橫泄腫滿如

水桑白皮煎湯下

礪砂丸

治婦人食癥久不消令人瘦弱食少

礪砂

青礬石

穿山甲炙

三稜炒

乾漆炒令

硫黃各半兩

巴豆

三十枚去皮心炒不去油

右為末用軟飯丸如小豆大每服五丸生薑橘皮湯下

右為赤用軟飯丸如小豆大每服五丸生薑橘皮湯下

礞石丸 治婦人食癥塊久不消攻刺心腹疼痛

青礞石 巴豆去皮心油 朱砂 粉霜并研 米香各二錢半 硃砂半兩

右研勻以糯米軟飯和丸如菉豆大每服二丸空心溫酒下取下惡物為度○右二方犯硃砂巴豆非胃氣強壯而積氣堅頑勢不兩立者不可輕用也

○治血癥

增味四物湯 治婦人血積

當歸 川芎 芍藥 熟地黄 三稜

莪朮 肉桂 乾漆炒烟盡各等分

右為釐末每服五錢水煎服○余妻曾患小腹積塊每遇寒觸劇痛不可忍諸醫治莫效余用此一服立止

治血積甚平穩

此方恐効遲而腰肋重痛須用行經藥方効

平正效速

甚當

六合湯 治婦人經事不行腹中結塊腰肋重痛

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

酒洗

官桂

蓬朮

煨切各等分

右吹咀每服四錢水煎空心服

血竭散

治婦人血痕作痛臍下脹滿月經不行發熱體倦

當歸

八分芍藥

炒桂心

血竭

蒲黃

炒省六分

玄胡索

炒四分

右爲細末每服二錢空心酒調下

牡丹散

治婦人久虛羸瘦血塊走心腹疼痛

牡丹皮

當歸

玄胡索

桂心

各一兩

赤芍藥

牛膝

莪朮

各三兩

京三稜

一兩半

右爲麤末每服三錢水酒各半盞煎服

當歸丸

治婦人月經不調血積證

當歸丸 治婦人月經不調血積證

當歸 赤芍藥 川芎 熟地黃 廣茂 京三稜各半

神麴炒 百草霜各二錢半

右為細末酒糊為丸如桐子大溫水下六七十丸

大黃散 治婦人血癥血瘕食積痰滯

川大黃七錢半碎微炒 龍甲醋炙黃去 牛膝去蘆一兩乾漆一兩炒

右為末用米醋一升煎為膏每服一錢食前溫酒調下

大紅花丸 治婦人血積癥瘕經絡滯滯

川大黃 紅花各二兩 蟲蠹十個去翅足

右取大黃七錢醋熬成膏和藥丸如桐子大每服五七丸食後

溫酒下日三服

○治腹中瘀血

桃奴散。治血蠱及瘀血停積。經水不通。男子跌撲損傷皆効。

桃奴炒 猥鼠糞炒 玄胡索 肉桂 五靈脂

香附炒 砂仁 桃仁各等分

右為末。每服三錢酒調服。

大黃湯。治婦人血瘀不消。及撲損血瘀。

大黃生用 桃仁湯浸去皮尖 桂去粗皮 郁李仁去皮研

生薑 地黃各一兩

右粗搗篩。每服三錢。水酒各半盞同煎至七分。去滓溫服。

琥珀散。治婦人經絡痞閉。腹內瘀血痛不可忍。

琥珀 乳香 沒藥各另研細末五錢

右每服二錢。水酒各半盞煎至七分。入地黃自然汁二合再煎。

三物固妙而
入地黃汁尤
佳

何首烏
有奇處

此治氣血疾
飲無往不可

右每服二錢。水酒各半。煮至七分。入地黃自熬。十二合。煎服。

數沸去滓。入溫酒服。不拘時候。

地榆散。治敗血。

何首烏 肉桂 地榆 香白芷 各等分

右為麤末。每服二錢。米泔一盞半。沙糖一小塊。煎至八分去滓。空心食前服。

○治疰瘕

麝香丸。治婦人疰瘕。冷氣兼症。氣心腹痛不可忍。

麝香 半兩

阿魏 二錢半 麝香 另研

五靈脂

三稜 各七錢半

桃仁 七錢 芫花 醋炒

檳榔 各一兩

莪茂 桂心 沒藥

木香 當歸 各半兩

右為細末。入麝香令勻。粳米飲飯為丸。如桐子大。每服十九。淡

昔有一女人患腹中痞塊攻心作痛服此而愈。重在冷氣不和恐非胎前所宜若產後血刺痛或血臟冷者宜之。

人身以氣血流行為元病此方以四物補血人參助氣和厚朴行上焦之氣懷香苦楝行下焦之氣木香

醋湯下無時

治婦人瘕瘕及血氣等神効方

用獾猪肝一具可及十兩者以巴豆五十枚去大皮紫在肝內用醞醋三碗熬肝極爛去巴豆不用入京三稜末和調得所丸如桐子大每服五丸食前溫熱酒下

葱白散專治一切冷氣不和及本臟膀胱氣攻衝疼痛又治婦人胎前後腹痛胎不安或血刺痛者兼能治血臟病冷百節倦痛肌體怯弱勞傷帶瘕久服盡除但婦人一切疾病最宜服此與後烏鵲煎丸兼服

川芎 當歸 枳殼 厚朴 桂心 乾薑 舶上懷香
芍藥 青皮 木香 麥芽 苦楝子 熟地黃 三稜

青皮行肝氣
乾薑溫行血
中之氣其餘
消之削之皆
所以溫而行
之也氣一行
則痛自止矣
以溫引入血
分使氣下行
而主內以葱
引氣外通而
開表如是則
內外和而痛
愈也
女人休陰而
用陽其經行
以厥陰為主
雞屬巽木性
通于肝肝氣
壯則血得其

莢茂 茯苓 神麴 人參各等分

右為細末。每服三錢。水一盞。連鬚葱白二寸。拍破。鹽半錢。煎至七分。內大黃。訶子。宜相度病狀。如大便秘。入大黃。同煎。不入

鹽。如大便秘。入訶子煎。

烏雞煎丸。治婦人胎前產後諸般疾患。並皆治之。

烏雞一隻 烏藥 蛇牀 牡丹皮 人參 白朮

黃蓍各一雨 蒼朮米滑浸切雨半 海桐皮 肉桂去粗皮

附子炮去皮臍 川烏炮 紅花 白芍藥 蓬莖朮

陳皮各二雨 玄胡索 木香 肉荳蔻 熟地黃洗焙

琥珀 草果各半雨

右細剉。用烏雞一隻。湯搗去毛及腸肚。將上件藥。安放雞肚

養而有生生之功若鳥雄雞者其體陰用陽之象有水生木木生火之義益女人以陰為體而性多熱滯故用此以鼓動肝氣而助其用耳本方用參芪白朮以益三焦之氣紅花熟地白芍以益心包肝腎之血氣滯而不行者有蒼陳烏藥木香以調之血滯而不

中用新磁瓶以好酒一斗同煮令乾去雞骨以油罈盛焙乾為細末煉蜜和丸如桐子大每服三十九胎前產後傷寒蜜糖酒下胎前氣悶壯熱炒薑酒下赤白帶下生薑地黃酒下產後敗血注心童子小便炒薑酒下產後血塊填築心腹疼痛玄胡索酒下胎前嘔逆薑湯下催生炒蜀葵子酒下安胎鹽酒下室女經脈當通不通四肢疼痛煎紅花酒下血氣攻刺心腹痰痛煎當歸酒下血暈樓欄燒灰酒調吞下血悶煎烏梅湯研硃砂下子宮久冷溫酒或棗湯下空心日一服血風勞人參酒吞下小腹痛炒茴香塩酒吞下血散四肢遍身虛浮黃腫赤小豆酒下常服溫酒醋湯任下並空心食前服血邪研硃砂麝香

夫法此解懷胎血氣塊硬發渴刺痛甚則欲死寃而苦之皆血之

行者在血中
皮琥珀以行
之因寒而凝
者有烏附肉
桂以溫之其
諸品類或溫
中以醒脾或
消穀以化積
或於血中行
氣或於氣中
行血或行表
或行裏皆所
以相贊成功
總之以氣血
為主溫行爲
用而又以脾
胃谷氣爲先
此其所以爲
諸病可服也
其自治胎前

酒下

夫疔瘡癰疽血氣塊硬發渴刺痛甚則欲死究而言之皆血之
所爲僕嘗治一婦人血氣刺痛極不可忍甚而死一二日方省
醫巫並治數年不愈僕以葱白散烏雞丸遂安又嘗治一婦人
血氣作楚如一小盤樣走注刺痛要一人扶定方少止亦用此
二藥而愈尋嘗小小血氣用此二藥亦有奇効故錄于此
朱先生云此藥大治心氣脾疼用之見効僕嘗以此治浮腫立
効陳宜人病血氣作楚痛不可忍服諸藥無効召僕診之兩關
脈弱沉爲肝脈沈差緊此血氣漸成疔瘡也只以此二藥治之
而愈又四明馬朝奉後院亦病此用藥治之亦愈

四等丸 治婦人疔瘡氣心腹疼痛飲食不消

諸疾則有所
未信
血邪者邪崇
之謂但因血
疾而成故云

皆血所為是

認塊要訣然

有上下左右

之分而痰飲

食積亦須有

辨不可執泥

一說即此方

所用肉冠草

果意可知矣

上脈繫小沉

涎皆血凝氣

滯之脈

卷五

三

三

大黃

剉碎
微炒

訶梨勒

法核

檳榔

木香

各等分

右為細末酒煮麵糊和丸如桐子大每食前以生薑橘皮湯下
十五丸溫酒亦得

又方

鼈甲

醋炙黃
去研爛

川大黃

剉碎
微炒

京三稜

炮製各
等分

右為末醋煮麵糊丸如桐子大每食前以生薑湯下一丸

木香礪砂丸

治婦人瘕癖積聚血塊刺痛脾胃虛寒宿食不消

久不瘥者

木香

礪砂另
研

丁香

官桂

附子

炮

乾漆

炒烟
盡

細墨

乳香另
研

廣莪

青皮

沒藥

另
研

大黃

剉碎
為泰

京三稜

猪牙皂角

乾薑

炮各
等分

巴豆霜

減半

器中慢火熬次下巴豆霜大黃熬成膏將前藥末與膏子為丸

此服法根丹
溪先生意
須知女子之
症與男子不
同
按此疝瘕三
字雖相連然
以方觀之只
重在瘕字蓋
女人又有瘕
疝一症故其
大抵疝字之
義取其如山
之高而突起
也然何彼
皆連稱焉

右除硃砂乳香沒藥外同為末以好醋一升化開硃砂去滓銀
器中慢火熬次下巴豆霜大黃熬成膏將前藥末與膏子為丸
如麻子大每服三五十丸食後溫酒送下加至大便利為度
○右三方皆攻積之劑全無補性虛人禁用實者亦須以四君
子四物湯兼服乃可

○治疝瘕

乾漆散 治婦人疝瘕久不消令人黃瘦尪羸兩脇妨悶心腹疼
痛

乾漆

炒令
烟盡

木香

羌活

醋炒

赤芍藥

桂心

當歸

川芎

琥珀

研各
半兩

大黃

炒二
兩

牛膝

七錢
半

桃仁

一兩

麝香

二錢
半

此方治肝經
居多

右為細末。每服一錢。溫酒調下。無時。

當歸散

治婦人疝瘕。血氣攻刺。心腹疼痛。不可忍。

龍甲

醋炙二兩

當歸

剉微炒

桂心

檳榔

大黃

剉微炒各一兩

川芎

吳茱萸

湯炮七次

木香

青皮

去白各半兩

蓬莪茂

赤芍藥

桃仁

湯浸去皮尖。麩炒微黃。各七錢五分。

右為散。每服三錢。薑一錢。三分水煎。熱服。不拘時。

硃砂丸

治婦人疝瘕。及積瘀血在臟。時攻腹脇疼痛。

川芒硝

硃砂

各一兩

當歸

雄黃

桂心

各半兩

大黃

炮三稜

各一兩

右為細末。米醋一碗。熬大黃末為膏。次入餘藥末和丸。如桐子。

大空心溫酒下十九。漸加至二十九。以利下惡物為度。

專在瘀血乃
涼行之劑是
知古人亦不
專主於熱矣
在人自擇之

大空。心溫酒下十九。漸加至二十丸。以利下惡物為度。

巴豆丸。治婦人疝瘕及血氣疼痛。

巴豆去皮心醋煮 硃砂 大黃炒各一兩 五靈脂

桃仁錢半 木香半兩以土各另為末

氣血痕食皆宜。弟藥太猛。慎之。

右煉蜜丸如菉豆大。淡醋湯空心下五丸。熱酒亦可。

黑神丸。

神麩 藁香各四兩 木香 椒炒香出汁 丁香各半兩

檳榔四枚 漆六兩半生半用重湯煮半日令香

此方以氣為主而血藥止用一味。然漆有飛補之力。又可以一當十也。甚平穩。宜備用。

右除椒漆外。五物皆半生半炒。為細末。用前生熟漆和丸。如彈子大。又用藁香末十二兩。鋪陰地。蔭乾。并藁香收器中。至極乾。去藁香。治腎氣。膀胱疝瘕。及疝墜。五膈血崩。產後諸血漏下。赤白。並一丸分四服。死胎一丸。皆綿灰酒下。一難產。炒葵子。

四十九枚。搗碎酒煎下。諸疾不過三服。瘕氣十服。膈氣癥瘕。

五服。血瘕三九當瘥。

一婦人病。腹中有大塊如杯。每發痛不可忍。諸藥莫愈。投此丸。

盡三服。杯氣盡消。終身不作。

晞露丸。治寒傷於內。氣凝不流。結於腸外。久為癥瘕。時作疼痛。

腰不得伸。名曰腸覃。

廣茂酒浸

三稜酒浸剉

乾漆泥去腥

川烏各五錢

硃砂四錢

青皮雄黃

茴香鹽炒

穿山甲炮各三錢

輕粉一錢

麝香半錢

巴豆三十個

右除研藥外。將巴豆炒三稜廣茂二味黃色。去巴豆不用。共為

末。入研藥勻。生薑汁打糊丸。如桐子大。每服二十丸至三十丸。

未入研藥勻。生薑汁打糊丸如桐子大。每服二十九至三十丸。

薑湯或酒下。空心食前服。

烏喙丸。治腸覃亦治乳餘并男子疝氣。

烏喙炮去皮各一錢 半夏湯洗四錢 石膏煨 藜蘆炒 牡蒙

茯苓酒浸 桂心 乾薑炮各一錢 巴豆七個研膏

右為末。煉蜜丸如豆大。每服三五丸。食後酒飲在下。

見覘丹。治寒客於下焦。血氣閉塞而成瘕。日以益大。狀如懷子。

名曰石瘕。

附子炮去皮瘠四錢 鬼羽箭 紫石英名三錢

澤瀉 肉桂

玄胡索 木香各一錢 血竭一錢半另研 水蛭 檳榔二錢半

桃仁三十個另研 三稜五錢 大黃

右為細末。用酒糊為丸如桐子大。每服三十丸。醋湯或溫酒下。

喪者溫之。留者行之。以病在下焦故多血分藥。

此小兒疳積
藥也。豈婦人
亦有之。大抵
以疳瘕之名
故偶類集之
耳。

食前。

蘆會丸。

治疳瘕肌肉消瘦。發熱潮熱。飲食少思。口乾作渴。或肝

疳食積。口鼻生瘡。牙齦蝕爛等証。

蘆會

胡黃連

黃連

炒

木香

白蘼黃

炒

青皮

各五錢

當歸

茯苓

陳皮

各一兩半

甘草

炙七錢

右為末。米糊丸如桐子大。每服七八十丸。米飲下。

濟陰綱目卷之五終

濟陰綱目卷之六

關中 武之望叔卿父著輯 武林 汪之琦奇玉父訂正

西陵 汪 淇懌倚子箋評 天都 查 望于周父叅閱

○求子

○論求子須知先天之氣

胡氏曰。男女交媾。其所以凝結而成胎者。雖不離乎精血。猶爲後天滓質之物。而一點先天真一之靈氣。萌於情慾之感者。妙合於其間。朱子所謂稟於有生之初。悟真篇所謂生身受氣初者是也。醫之上工。因人無子。語男則主於精。語女則主於血。著論立方。男以補腎爲要。女以調經爲先。而又參之以補氣行氣之說。察其脉絡。究其虧盈。審而治之。夫然後一舉可孕。天下之男無不父。女無

不母矣。

○論求子脉須和平

以尺寸浮沉
分氣血

陳楚良曰。人身氣血各有虛寔寒熱之異。惟察脉可知。合脉而獨言藥者妄也。脉有十二經。應十二時。一日一周與天同運。循環無端。其至也。既不宜太過而數。數則熱矣。又不宜不及而遲。遲則寒矣。不宜太有力而寔。非正氣能自寔也。正氣虛而火邪來乘。以寔之也。治法先當散鬱以伐其邪。邪去而後正可補也。不宜太無力而虛。虛乃正氣正血虛也。治法惟當補其氣血耳。亦有男婦上熱下寒。表實裏虛。而未得子者。法當臨睡時服涼膈之藥。以清其上。每晨食未入口時服補藥。以溫其下。暫進升散之藥。以達其表。及服厚味之藥。以實其裏。又有女人氣多血少。寒熱不調。月水違期。

又須分出氣
虛血虛不可
並補
寒熱有上下
治法分暑

生子要訣

服厚味之藥以實其裏。又有女人氣多血少。寒熱不調。月水違期。或後或先。白帶頻下。而無子者。皆當診脉。而以活法治之。務欲使其夫婦之脉。皆和平有力。不熱不寒。交合有期。不妄用精。必能生子。子不殤。故欲得子者。必須對脉立方。因病用藥。

○論求子先調經

理婦人者。先須熟此証治。

瀉泄調經。惟子和可法。有積滯則汚濁不清。虛未

婁氏曰。求子之法。莫先調經。每見婦人之無子者。其經必或前或後。或多或少。或將行作痛。或行後作痛。或紫或黑。或淡或凝。而不調。不調則血氣乖爭。不能成孕矣。詳夫不調之由。其或前或後。及行後作痛者。虛也。其少而淡者。血虛也。多者氣虛也。其將行作痛。及凝塊不散者。滯也。皆黑色者。滯而挾熱也。治法。血虛者。四物氣虛者。四物加參芪。滯者。香附。縮砂。木香。檳榔。桃仁。玄胡。滯久血沉。痼者。吐之下之。脉證熱者。四物加芩連。脉證寒者。四物加桂附。及

回則新生之
氣不鼓一味
香附有去舊
生新之妙

此五者非特
求子者之良
藥亦可為攝
生者之真方

紫石英之類是也。直至積去滯行虛回。然後氣血和平能孕子也。予每治經不調者。只一味香附末。醋為丸服之。亦百發百中也。

○論求子貴養精血

袁了凡先生云。聚精之道。一曰寡慾。二曰節勞。三曰息怒。四曰戒酒。五曰慎味。今之談養生者。多言採陰補陽。久戰不泄。此為大謬。腎為精之府。凡男女交接。必擾其腎。腎動則精血隨之而流。外雖不泄。精已離宮。未能堅忍者。亦必有真精數點。隨陽之痿而溢出。此其驗也。如火之有烟焰。豈有復反於薪者哉。是故貴寡慾。精成於血。不獨房勞之交。損吾之精。凡日用損血之事。皆當深戒。如目勞於視。則血於視耗。耳勞於聽。則血以聽耗。心勞於思。則血於思耗。吾隨事而節之。則血得其養。而與日俱積矣。是故貴節勞。主閉

火也。怒則傷肝。而相火動。動則疎泄。者用事而閉藏。不得其體。維

藏者腎也。司疎泄者肝也。二臟皆有相火。而其系上屬於心。心君火也。怒則傷肝。而相火動。動則疎泄者用事。而閉藏不得其職。雖不交合。亦暗流而潛耗矣。是故當息怒。人身之血。各歸其舍。則常疑酒能動血。人飲酒則面赤。手足俱紅。是擾其血而奔馳之也。血氣既衰之人。數月無房事。精始厚而可用。然使一夜大醉。精隨薄矣。是故宜戒酒。內經云。精不足者。補之以味。然醲郁之味。不能生精。惟恬淡之味。乃能補精耳。蓋萬物皆有真味。調和勝而真味衰矣。不論腥素。淡煮之得法。自有一段冲和恬淡之氣。益人腸胃。洪範論味。而曰稼穡作甘。世間之物。惟五穀得味之正。但能澹食穀味。最能養精。又凡煮粥飯。而中有厚汁。滾作一團者。此米之精液所聚也。食之驟能生精。試之有效。○煉精有訣。全在腎家下丹田。

立於外之
說固是建
然猶未確
主論

內腎二字還
差二線法得
口訣

腎一竅名玄關。外腎一竅名牝戶。真精未洩，乾體未破，則外腎陽氣至子時而興。人身之氣與天地之氣兩相脗合，精愧體破而吾身陽生之候漸晚。有丑而生者，次則寅而生者，又次則卯而生者，有終不生者，始與天地不相應矣。煉之之訣，須半夜子時，卽披衣起坐，兩手搓極熱，以一手將外腎兜住，以一手掩臍而凝神於內腎，久久習之，而精旺矣。

○論孕子必知絪縕之時

袁了凡先生云：天地生物，必有絪縕之時；萬物化生，必有樂育之時。猶犬至微，將受娠也，其雌必狂呼而奔跳，以絪縕樂育之氣觸之，而不能自止耳。此天然之節候，生化之真機也。世人種子有三：三十時辰、兩月半、二十八九。君須第此，特言其大槩耳。非的論也。

三十時辰。兩日半。二十八九君須筭。此特言其大槩耳。非的論也。

須得逆取之
道行之便是
築基此先天
氣生時也

丹經云。一月止有一日。一日止有一時。凡婦人一月經行不可必
有一日。綢緇之候。於一時辰間。氣蒸而熱昏而悶。有欲交接不可
忍之狀。此的候也。於此時逆而取之。則成丹。順而施之。則成胎矣。
其日。三日月出庚。又曰。溫溫鉛鼎。光透簾幃。皆言其景象也。當其
慾情濃動之時。子宮內有如蓮花蕊者。不拘經淨幾日。自然挺出
陰中。如蓮蕊初開。內人洗下體。以手探之。自知也。但含羞不肯言
耳。男子預密告之。令其自言。一舉即中矣。
○論合男女必當其年

褚尚書求男論云。建平孝王妃姬皆麗無子。擇民家未笄女子八
御。又無子。問曰。求男有道乎。澄對曰。合男女必當其年。男雖十六
而精通。必三十而娶。女雖十四而天癸至。必二十而嫁。皆欲陰陽
今年十二而
子者亦事之

常

方是朱子
法

盛衰之道在
七損八益中

充實然後交而孕。孕而育。育而子堅壯強壽。今未笄之女。天癸始至。已近男色。陰氣早泄。未完而傷。未實而動。是以交而不孕。孕而不育。育而子脆不壽。此王之所以無子也。然婦人有所產皆女者。有所產皆男者。大王誠能訪求多男婦人。至宮詢有男之道也。王曰善。未再期生六男。夫老陽遇少陰。老陰遇少陽。亦有子之道也。

○論男女精血盛衰

褚尚書曰。飲食五味。養髓骨肉。血。肌膚毛髮。男子爲陽。陽中必有陰。陰中之數八。故一八而陽精升。二八而陽精溢。女子爲陰。陰中必有陽。陽中之數七。故一七而陰血升。二七而陰血溢。陽精陰血。皆飲食五味之秀實也。方其升也。智慮闕明。齒牙更始。髮黃者黑。筋弱者強。暨其溢也。凡充身肢體手足耳目之餘。雖針灸之瀝。無

是以父一肢。腐則子一肢不肖其父。母一目。腐則子一目不肖其

血場者濟自
液精竭者必
血來一以氣
不及化血一
以血不及化
精二者病則
一般其為害
又不止于此

有不下。凡子形肖父母者。以其精血嘗於父母之身。無所不歷也。是以父一肢廢。則子一肢不肖其父。母一目廢。則子一目不肖其母。精未通。而御女以通其精。則五體有不滿之處。異日有難狀之疾。陰已痿而思色。以降其精。則精不出。內收小便道澀。而為淋。精已耗而復竭之。則大小便道牽疼。愈疼則愈欲。大小便愈便則愈疼。女人天癸既至。踰十年無男子合。則不調。未踰十年思男大合。亦不調。不調則舊血不出。新血誤行。或漬而八骨。或變而之腫。或雖合而難子。合男子多則瀝枯。虛人產乳眾。則血枯殺人。觀其精血思過半矣。

○論成胎分男女之異

褚尚書曰。男女之合。二精皆暢。陰血先至。陽精後衝。血開是精。精

八爲骨而男形成矣。陽精未入陰血後參精開裏血。血入爲骨而女形成矣。陽氣聚面。故男子面重。溺死者必伏。陰氣聚背。故女子背重。溺死者必仰。走獸溺死仰伏皆然。陰陽均至。非男非女之身。精血散分。駢胎品胎之兆。父少母老。產女必羸。母壯父衰。生男必弱。古之良工。首察乎此。氣受偏痺。與之補之。補羸女則養血壯脾。補弱男則壯脾節色。羸女宜及時而嫁。弱男宜待壯而婚。此疾外所務之本。不可不察也。

丹溪曰。成胎以精血之後。先分男女者。褚澄之論也。愚竊惑焉。後聞東垣方有曰。經水斷後。一二日血海始淨。精勝其血。感者成男。四五日後。血脈已旺。精不勝血。感者成女。此論亦爲未瑩。何以言之。易曰。乾道成男。坤道成女。夫乾坤陰陽之性情也。左右陰陽之

血能攝之。陰之化也。精成其骨。此萬物資始於乾元也。血成其

曰柔右

道路也。男女陰陽之儀象也。父精母血因感而會。精之泄陽之施也。血能攝之。陰之化也。精成其骨。此萬物資始於乾元也。血成其胞。此萬物資生於坤元也。陰陽交媾。胎孕乃凝。胎之所居。名曰子宮。一系在下。上有兩岐。一達於左。一達於右。精勝其血。及剛日陽時感者。則陽爲之主。受氣於左子宮。而男形成。精不勝血。及柔日陰時感者。則陰爲之主。受氣於右子宮。而女形成。或自分男分女。吾知之矣。其有雙胎者。將何如。曰。精氣有餘。岐而分之。血因分而攝之故也。若夫男女同孕者。剛日陰時感。柔日陽時感。則陰陽混雜。不屬左。不屬右。受氣於兩岐之間者也。亦有三胎。四胎。五胎。六胎者。猶是而已。或曰。其有男不可爲父。女不可爲母。與男女之兼形者。又若何而分之。耶。予曰。男不可爲父。得陽氣之虧者也。女不

可爲母得陰氣之塞者也。兼形者由陰爲駁氣所乘而爲狀不一。以女兼男形者有二。一則遇男爲妻。遇女爲夫。一則可妻而不可夫。又有下爲女體上具男之全形。此又駁之者也。或曰駁氣所乘獨見於陰而所乘之形又若是之不同耶。予曰陰體虛駁氣易於乘也。駁氣所乘陰陽相混無所爲主。不可屬左。不可屬右。受氣於兩岐之間。隨所得駁氣之輕重而成形。故所兼之形有不可得而同也。

○論男女各由百脉齊到

程鳴謙云。褚澄氏言男女交合。陰血先至。陽精後衝。而男形成。陽精先入。陰血後聚。而女形成。信斯言也。人有精先洩而生男。精後洩而生女者。獨何歟。東垣曰。經水纔斷一二日。血海始淨。感者成。

胎信斯言也。人有經始斷。交合生女。經久斷。交合生男者。亦有四。

男四。五日。血脈已旺。感者成女。至於六七日後。則雖交感。亦不成胎。信斯言也。人有經始斷。交合生女。經久斷。交合生男者。亦有四五日以前。交合無孕。八九日以後。交合有孕者。獨何歟。俞子木撰。廣嗣要畧。著方立圖。謂實陽能入虛陰。實陰不能受陽。卽東垣之故見也。又謂微陽不能射陰。弱陰不能攝陽。信斯言也。世有疝羸之夫。怯弱之婦。屢屢受胎。雖欲止之而不能止者。亦有血氣方剛。精力過人。顧乃艱於育嗣。而莫之救者。獨何歟。朱丹溪論治。專以婦人經水爲主。然富貴之家。侍妾已多。其中寧無月水當期者乎。有已經前夫頻頻生育。而娶此以圖其易者。顧亦不能得胎。更道與他人轉盼生男矣。豈不能受孕於此。而能受孕於彼乎。愚以爲父母之生子。如天地之生物。易曰。坤道其順乎。承天而時行。夫知

承天之行乃
是至靈然有
不毛之地豈
坤道不順乎

地之生物。不過順承乎天。則知母之生子。亦不過順承乎父而已。知母之順承乎父。則種子者。果以婦人為主乎。以男子為主乎。然所謂主於男子者。不拘老少強弱。康寧病患。精易洩難洩。只以交感之時。百脉齊到為善耳。交感而百脉齊到。雖老弱病患。易洩亦可以成胎。交感而百脉參差。雖少強雖康寧。雖難洩亦難以成胎矣。婦人所構之血。固由於百脉合聚。較之男子之精。不能無輕重之分也。孔子贊乾元資始。曰大贊坤元資生。曰至得無意乎。若男女之辨。又不以精血先後為拘。不以經盡幾日為拘。不以夜半前後交感為拘。不以父強母弱。母強父弱為拘。只以精血各由百脉齊到者。別勝負耳。是故精之百脉齊到有以勝乎血。則成男矣。血之百脉齊到有以勝乎精。則成女矣。至有既孕而小產者。有產而

修短耳。世人不察其精血之盛衰。既已定於真受之初。乃以小產專

經有不可趕者。謂女人之經。有一年一度行者。有四季行者。

之百脈齊到有以。勝乎精。則成女矣。至有既孕而小產者。有產而不育。有育而不壽者。有壽而黃耆無疆者。則亦精血之堅脆分俾修短耳。世人不察其精血之堅脆。已定於稟受之初。乃以小產專責之母。以不育專付之男。以壽夭專諉之數。不亦謬乎。

○趕經法

求嗣全書載趕經調和訣云。有一女人。月經來時。專在下弦之期。必用養血之法。以逐之。視其色紫。則知血熱。服涼血藥。以緩其氣。則氣血和而來遲。漸漸趕之。定到初頭。視其色淡短少者。則服養血和血藥。養其命門。亦赶到初頭。察女人肥瘦。強弱而用藥。一月便不能合。趕之之久。定到上弦。此趕經之法也。以女人上弦交多生男耳。又有一等女人。身體肥胖。子宮脂膜長滿。經水雖調。亦令無子。須服開子宮之藥。以消其脂膜。

胚胎兆于一氣。胚者氣之形。膏者氣之疑。胎者形之著。先天以制生化。故以水火金木土石。制而化焉。後天順序而成。故以水火土金水相生而養。以逆而化。以順而成。自然之妙也。

○逐月養胎法

袁先生云。巢氏論婦人妊娠。一月名胎。胚足厥陰脉養之。二月名始膏。足少陽脉養之。三月名始胎。手少陰脉養之。四月始受水精。以行血脉。手少陽脉養之。五月始受火精。以成其氣。足太陰脉養之。六月始受金精。以成其筋。足陽明脉養之。七月始受木精。以成其骨。手太陰脉養之。八月始受土精。以成膚革。手陽明脉養之。九月始受石精。以成毛髮。足少陰脉養之。十月臟腑關節人神俱備。足太陽脉養之。此其大略也。若求其細。則受胎在腹。七日一變。展轉相成。各有相生。大集經備矣。今婦人墮胎。在三月五月七月者。多在二四六月者。少。臟陰而腑陽。三月屬心。五月屬脾。七月屬肺。皆在五臟之脉。陰常易虧。故多墮耳。如昔曾三月墮胎。則心脉受

治。脾不然。至五月復墮。惟有一月之內墮胎。則人皆不知有胎。但

皆在五臟之脈。陰常易虧。故多墮耳。如昔曾三月墮胎。則心脈受傷。先須調心。不然至三月復墮。昔曾五月墮胎。則脾脈受傷。先宜治脾。不然至五月復墮。惟有一月之內墮胎。則人皆不知有胎。但知不受妊。不知其受而墮也。一月屬肝。怒則墮。多洗下體。則竅閉。亦墮。一次既墮。則肝脈受傷。他次亦墮。今之無子者。大半是一月墮胎。非盡不受妊也。故凡初交之後。最宜將息。勿復交接。以擾其子宮。勿令怒。勿令勞。勿令舉重。勿令洗浴。而又多服養肝平氣之藥。胎可固矣。

○論痰飲不孕

張子和云。戴人過譙都營中飲會。有一卒說出妻事。戴人問其故。荅曰。吾婦爲室女時。心下有冷積。如覆盆。按之如水聲。以熱手慰之如冰。娶來已十五年矣。恐斷吾嗣。是以去之。戴人曰。公勿黠也。

此紫堇子
和生不能

如用吾藥病可除孕可得卒從之戴人診其脉寸脉沉而遲尺脉
洪大有力非無子之候也可不逾年而孕其良人嘆曰試之先以
三聖散吐涎一斗心下平軟次服白朮調中湯五苓散後以四物
湯和之不再月氣血合度數月而娠一子戴人常曰用吾此法無
不子之婦此言不誣一婦人年三十四歲夢與鬼神交驚怕異
常及見神堂陰司舟楫橋梁如此一十五年竟無姙娠巫祈覲福
無所不至鑽肌炙肉孔穴萬千黃瘦發熱引飲中滿足腫委命於
天一日苦請戴人戴人曰陽火盛於上陰水盛於下見鬼神者陰
之靈神堂者陰之所舟楫橋梁水之用兩手寸脉皆沉而伏知胸
中句寔疾也凡三湧三泄三汗不旬日而無夢一月而有娠

○論求子禁用熱劑

處遍閱古方惟秦桂九其辭確其意專用溫熱藥近平人情欣然

妙在溫和二
字盡大寒大
熱皆不能生
物故也

丹溪秦桂丸論曰。無子之因多起於婦人。醫者不求其因。起於何處。遍閱古方。惟秦桂丸其辭確。其意專。用溫熱藥。近平人情。欣然受之。銳然服之。甘受燔灼之禍。猶懵然不悔。何者。陽精之施。陰血能攝之。精成其子。血成其胞。胎孕乃成。今婦人之無子者。率由血少。不足以攝精也。血之少也。固非一端。然欲得子者。必須調補陰血。使無虧欠。乃可推其有餘。以成胎孕。何乃輕用熱劑。煎熬臟腑。血氣沸騰。禍不旋踵矣。或曰。春氣溫和。則萬物發生。冬氣寒凜。則萬物消損。非秦桂丸之溫熱。何以得子。臟溫煖而成胎耶。予曰。詩曰。婦人和平。則樂有子。和則血氣均。平則陰陽不爭。今得此藥。經血必轉紫黑。漸成衰少。或先或後。始則飲食驟進。久則口苦而乾。陰陽不平。血氣不和。疾病蜂起。焉能成胎。縱然成胎。生子亦多病。

此註最當

而不壽。以秦桂丸耗損天真之陰也。戒之慎之。按秦桂丸施子樂。服調理補藥亦無效。但忌施于瘦人火多者也。

○論孕子雜法

丹溪曰。婦人無子者。多由血少不能攝精。初醫悉謂子宮虛冷。托以辛熱之藥。煎熬臟腑。血氣沸騰。禍不旋踵。或有服艾者。不知艾性雖熱。是性下寒。寒者宜之。

六味丸果驗。若是肥盛婦人。稟受甚厚。恣於瀾宜之人。經水不調。不能成胎。謂之軀脂滿溢。閉塞子宮。宜行濕燥痰。用星半。蒼朮。白朮。防風。羌活。滑石。或導痰湯之類。○若是瘦怯性急之人。經水不調。不能成胎。謂之子宮乾澀。無血不能攝受精氣。宜涼血降火。或四物湯加香附。黃芩。柴胡。養血養陰等藥。○東垣有六味地黃丸。以補婦人之

薛氏曰。婦人之不孕。亦有因六淫七情之邪。有傷衝任。或宿疾滯

六味丸果驗

附註：此丸能補血養陰等藥。東垣有六味地黃丸，以補婦人。

衣青極當誠
哉言也

度

豈此三方所
能盡宜擴充
之

陰血不足無子服之者能使胎孕

薛氏曰婦人之不孕亦有因六淫七情之邪有傷衝任或宿疾淹

留傳遺臟腑或子宮虛冷或氣旺血衰或血中伏熱又有脾胃虛

損不能營養衝任審此更當察其男子之形質虛實何如有腎虛

精弱不能融育成胎者有稟賦元弱氣血虛損者有嗜慾無度陰

精衰憊者各當求其源而治之至於大要則當審男女之尺脉若

左尺微細或虛大無力者用八味丸左尺洪大按之無力者用六

味丸兩尺俱微細或浮大者用十補丸若誤用辛熱燥血不惟無

益反受其害

○脉法

素問曰督脈生病女子不孕

醫家綱目

卷六 求子

十一

脈經云婦人少腹冷惡寒久年少者得之此為無子年大者得之

絕產○脈微弱而瀉年少得此為無子中年得此為絕產○肥人

脈細胞有寒故令少子其色黃者胸中有寒

○治血虛不孕

加味四物湯治婦人不孕久服有子甚好

當歸

川芎

各二錢

白朮

微炒

熟地黃

酒洗各一錢半

白茯苓

芍藥

微炒

續斷

各一錢

阿膠

香附

醋煮八分

橘紅

七分

甘草

炙三分

右剉水二鍾煎八分食遠服

加味四物湯治血氣兩虛不孕

當歸

酒洗

白芍藥

炒

肉蓯蓉

各一錢

熟地黃

酒洗

右剉水煎服○每月經前三服經正行三服經行後三服

內蘊蓉治絕陰不產

極穩當但氣旺血熱者須去芍朮而當歸味辛有熱症者亦須裁酌

內經

當歸酒

白芍藥

肉桂

熟地黃

白朮

白茯苓各一錢

人參五分

川芎三錢

右剉水煎服。○每月經前三服。經正行三服。經行後三服。

調經種玉湯

凡婦人無子。多因七情所傷。致使血衰氣盛。經水

不調。或前或後。或多或少。或色淡如水。或紫如血塊。或崩漏帶

下。或肚腹疼痛。或子宮虛冷。不能受孕。宜此藥。有發百中。効可

通神。

妙在吳茱萸

當歸酒洗

川芎

吳茱萸炒各四錢 熟地黃酒洗

香附炒各六錢

白芍藥

白茯苓去皮

陳皮

牡丹皮

玄胡索各三錢

右剉作四劑。每一劑加生薑三片。水一碗半煎一碗。空心溫服。

渣再煎。臨臥服。等經至之日服起。一日一劑。藥盡經止。則當交

媾。即成孕矣。縱不成孕。經當對期。俟經來再服四劑。必孕無疑。

妙在調氣

二味簡切尤
妙在鹿角屑

○若過期而經水色淡者加官桂炒乾薑熟艾各二錢○若先期三四日色紫者加條芩三錢

經驗育胎丸 治婦人久無子嗣服此經調血盛子宮溫煖成孕

孕後服之可保胎氣堅固

當歸酒浸

熟地黃酒蒸白朮

香附各四兩

砂仁三兩

芍藥酒炒

川芎

川續斷酒洗陳皮

黃芩

酒炒各二兩

右為細末糯米糊丸如桐子大每服七八十丸空心淡醋湯下

酒亦可以乾物壓之

婦人歸附丸 不但種子且無小產產後諸證

香附子

大者砂礮內醋者極熟水洗焙乾為末一筋

當歸

大者上苦稀用身酒洗切片焙乾為末十兩

右三味和勻醋糊丸如桐子大每服三錢早起臨睡各一服自

妙在脾胃

當歸大者片若用其酒洗

鹿角

大者同土粗皮連末二三兩細紙墊鉄鍋內文火炒為細末用二兩

右三味和勻醋糊丸如桐子大每服三錢早起臨睡各一服白

滾湯下一月經後八房即孕

神仙附益丸 不惟治婦人百病而生育之功效如神

香附米

二斤用童便浸透取出水洗淨露一宿晒乾再浸再露再晒如此二次用

益母草

十二兩東流水洗淨烘乾為末

右再用香附四兩北艾一兩煮汁用三分醋七分和前藥為丸

如桐子大每服五七十九空心臨臥淡醋湯下

加味地黃丸 治婦人久無孕育者効如影響

熟地黃

四兩

山茱萸肉

各二兩

白茯苓

各一兩

牡丹皮

各一兩

五錢

澤瀉

香附子

童便炒各一兩

斷艾

醋煮五錢

血熱者不宜
艾附加艾此
亦似回蛇添
足

右為末煉蜜凡如桐子大每服七八十丸滾湯下

金蓮種子仙方

一名夢熊丸有小茴香二兩無熟地黃

女人服之有孕

此亦烏骨雞丸之變方他

方多用參

熟地黃

酒洗

當歸

酒洗

白芍藥

酒炒

白木以補氣

米泔水浸

蛇床子

酒洗

益母草

酒洗

川芎

而此藥蒼木砂仁益母以

玄胡索

微炒

陳皮

水洗去白

丹參

水洗各二兩

砂仁

去皮一兩五錢

行氣他方又佐以艾柱以

去核香附

四製各五兩

姜等熱藥以溫經此則以

右為極細末先用白毛烏骨雄雞一隻預先喂養一月勿令與

蛇床山茱萸

雌雞同處臨時將雞緝死不出血乾去毛剖開去腸內汚物并

煖其下而又以條茶佐之

繚內宿食肫內黃皮用酒洗淨一應事件仍裝入雞肚內不令

則寒熱均停可無傷雙之

見水置壘內入酒二觔封固重湯煮爛取出割下淨肉搗如泥

宜矣服之當

仍將雞骨用酥油和原汁或酒炙餛為末入前藥末內拌勻再

自有驗

十九漸至八九十九空心中清水飲下○如月信先期而至者加

此方加法服
法尤為精當
可現諸方而
變通之理又
頭頭是道矣
玩之玩之

以姜汁浸地
黃以醋煮艾
者有竅剋等
分亦是一法

服法須知

仍將雞骨用酥油和原汁或酒炙煉為末入前藥末內拌勻再
用醋煮米糊同雞肉左杓內搗極細為丸如桐子大每服四五
十丸漸至八九十丸空心清水飲下○如月信先期而至者加
黃芩地骨皮黃連各一兩半清水飲下○如月信後期而至者
加黃耆一兩人參白朮各一兩半溫酒或淡鹽湯下○如白帶
者加蒼朮白朮升麻白芷各一兩半淡薑下

百子建中湯 女人服此藥調經養血安胎順氣不問胎前產後
月事參差有餘不足諸證悉皆治之

當歸酒洗

南川芎

白芍藥

酒炒

熟地黃

姜外浸焙

真阿膠

蛤粉炒成

珠

蘄艾葉

醋煮各一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服八十丸空心百沸湯點醋少
許下內寒者溫酒下

此平順之劑。而麥門黑豆亦心腎藥也。而貝母與熟地用能無功過相掩乎。

此妙在澤蘭。蠅蛸而學者尤須看症的確。熟察本草便能得方中三昧。素一苦矣。

加味養榮丸。此方服之有孕。且無小產之患。

當歸酒

熟地黃酒

白朮各一

芍藥

川芎

黃芩

香附各一

陳皮

貝母去心

茯苓

麥門冬去心各一兩

阿膠

甘草炙各五錢

黑豆炒去皮四

十九粒

右為細末。煉蜜丸如桐子大。每服七八十丸。食前空心白湯酒

任下。忌食諸血。

加味香附丸。男服聚精丸。女服此。

香附

一斤

分四分

一分酒浸二宿

搗碎炒

一分米醋浸

同上一

分童便浸同上

一分用山梔四兩煎濃汁

浸同

澤蘭

淨葉六

海螵蛸六兩搗

碎炒

當歸四兩

酒洗

川芎三

白芍藥

四兩

熟地黃八兩

膏焙乾

右為末。用浮小麥麩酒醋水打糊為丸。如菉豆大。每日早晚兩

大五補丸。瘦人無孕。乃無血攝精宜潤。

此三方係男
人藥也借以
治婦人之無
嗣者正所謂
因病以藥方
勿拘方以治
病

服白湯酒任下忌食萊菔及羊肉生冷

大五補丸 瘦人無孕乃無血攝精宜潤

天門冬去心 麥門冬去心 菖蒲 茯苓 人參 益智

枸杞子 地骨皮 遠志肉 熟地黃各等分

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心酒下服本方數
服後以七宜丸泄之

增損三才丸

天門冬酒浸去心 熟地黃酒蒸 人參 遠志去心 五味子

茯苓酒洗 鹿角酥炙

右為細末煉蜜杵千下為丸如桐子大每服五十丸空心好酒
下○年老欲補加混元衣即頭生兒胎衣全個酒浸晒乾為末

細閱此方不用芍藥而用木香其意在行肝而不欲歛肝也殊不知胎之墮又苦於血之行故凡艾附之類俱用醋製以醋入肝有微陽之氣又可以調血也其加松烟亦為固血而設目其如阿膠

八藥 一方加白馬莖酥炙○一方加附子補相火不足○一

方加麥門冬令有人力○一方加續斷以續筋骨○一方加沉

香煖下焦虛冷

補効墨附丸 治婦人久無子而經事不調及數墮胎者服之可

立致効

香附 一斤分四分用米醋童便鹽水酒各浸一日夜綿艾四兩用米醋二碗同香附煮乾搗爛成餅新瓦焙乾

白茯苓 人參 當歸 川芎 熟地黄 一宿

上等徽墨 火煨醋粹 木香 錢五

右九味各另為末醋糊丸如桐子大每服五十丸空心好酒下

青蒿烏雞丸 婦人服能令多子

青蒿 即野蒿五斤香附子 童便鹽水酒醋各浸四兩炒共一斤蘆艾 醋

根快苓 人參 白朮 川芎 各一 鱉甲 醋煮一

青蒿即野蒿五香附子童便鹽水酒醋各一蘄艾煎

秦當歸酒洗一宿炒牡丹皮地骨皮白芍藥酒洗黃耆蜜炙

茯苓人參白朮川芎各一兩鱉甲醋煮一兩五錢

右爲細末取白毛烏骨雄雞一隻初發聲者絞殺乾去毛不用水湯亦不用水洗惟用水去脚上粗皮用好酒入磁器內同熟地黃二兩煮雞熟去骨合前藥搗爛作餅復晒乾爲末仍用煮雞酒調糯米粉爲糊凡如桐子大每服七八十丸酒下日三服不拘時一月見効造藥忌鐵器

大烏雞丸治女人羸瘦血虛有熱經水不調崩漏帶下不能成胎及骨蒸等證

香附一斤四製熟地黃兩四生地黃當歸白芍藥人參各兩

川芎各三兩半白朮黃芪牛膝柴胡牡丹皮

知母 貝母各一兩 黃連 地骨皮 玄胡索 乾姜各一兩

白茯苓二兩半 秦艽一兩半 艾葉 青蒿各四兩

右香附等二十一味。其為細末。用自毛烏骨雄雞一隻。緝死。主毛與腸。將艾蒿各一半。裝入腹內。將雞重餘艾蒿同入壺內。以童便和水浸過雞二寸許。隔湯煮爛。取出去骨。焙肉乾為末。如有筋骨疼痛者。去肉焙骨焦為末。與前末和勻。雞汁打糊為丸。如桐子大。每服五六十丸。漸加至七八十丸。溫酒或米飲下。忌煎炒葷菜。

小烏雞丸 治婦人百病

吳茱萸 良姜 白姜 當歸 烏藥 玄胡索
破故紙 川椒 陳皮 劉寄奴 生地黃 菥蓂

灰二味
右為末。用自毛烏骨雄雞一隻。緝死。去骨取肉。搗如泥。拌藥末。酒

巧只在荷葉
灰一味

川芎

各一兩

荷葉灰

四兩

桂艾

一兩

用鳳凰衣更
巧中之巧

此方大熱非
胎不安者所
宜

腸風漏血又
安男之

斑猶太毒不
可妄試

赤痢之用亦
在荷葉乎

右爲末。用自毛烏骨雞。緝死。煮爛。去骨。取肉。搗如泥。拌藥。未晒
乾。磨細。以雞汁作糊。爲丸。如桐子大。每服五十丸。空心。隨引下。
○如從來未曾生台者。乃油膜包裹子宮。以致不能生氣成孕。
宜加鳳凰衣。燒存性。七個。硃砂爲衣。○如腹痛血黑色者。加炒
黃連。有濕痰者。加南星。蒼米香附。同丸。○月水不通。紅花。蘇木
酒下。○子宮久冷。茯苓煎湯下。○赤帶。清茶下。○白帶。牡蠣粉
調酒下。○血成豆淋。酒調綿灰下。○胎不安。蜜酒下。○腸風。陳
米飲調百草霜下。○心痛。薑蒲酒下。○腹痛。芍藥酒下。○胎漏
下血。烏梅酒下。○胎死不動。斑猶三個。調酒下。○胎衣不下。薑
薑菜研水下。○胎前產後白痢。乾姜煎湯下。○赤痢。甘草煎湯

頭風眼黑俱
宗書慶義
生瘡豈可用
熱藥

下○耳聾。臘茶清下。○頭風。薄荷煎湯下。○血風眼黑。甘草湯下。○身體疼痛。黃芪未調酒下。○腰脚痛。當歸酒下。○生瘡。地黃煎湯下。○氣塊血塊作痛。與葱白湯調服。○四肢浮腫。麝香湯下。○咳嗽喘滿。杏仁桑白皮煎湯下。○常服溫酒醋任下。

十全濟陰丸

方論曰。胎嗣主於濟陰者何也。蓋人之所稟。陽常

有餘。陰常不足。氣常有餘。血常不足。在女人。癸水易虧而難盈。以至不育。舊方多以辛香熱燥之劑。為溫煖子宮。偏助陽氣。反耗陰血。豈能成胎。况女性多氣多鬱。氣多則為火。鬱多則血滯。故經脉不行。諸病交作。生育之道。遂阻矣。又如脾胃虛弱者。偏用四物涼血等藥。則脾胃益虛。飲食頓減。使氣血無資生之地。何以得成胎孕。為子嗣之計者。莫如養血順氣。調經為本。而兼

減之。初無一定之法也。此方則以當歸身。養血和氣。為君。入手

何以得成胎孕爲子嗣之計者莫如養血順氣調經爲本而兼以甘溫養脾辛溫開鬱斯爲至當且調經之法又當因人而加減之初無一定之法也此方則以當歸身養血和氣爲君入手少陰經以心主血也入足太陰經以脾畏血也入足厥陰經以肝藏血也熟地黃補腎中元氣生心血與芍藥同用又生肝血川芎乃血中之氣藥下行血海通經導氣爲臣人參通經活血助熟地黃以補下元白朮利腰臍間血與人參同用補益脾氣香附疎氣散鬱佐澤蘭能生新血而和乎氣體牡丹皮養新血去壞血固真氣行結氣山藥能強陰補虛枸杞子補腎水而止下血腰疼爲佐紫石英補心氣散心中結氣填補下焦艾葉助香附和百脉溫子宮兼行血藥而平其寒炙甘草通經脉血氣而和諸藥其緩肝經之急爲使十年不孕者此藥主之

竊謂此方妙

當歸身洗酒熟地黃 香附子童便煮乾山藥 白朮各二兩

枸杞子 人參各二兩 斷交葉去梗筋二兩同香附用陳 川芎醋老酒煮一時搗爛焙乾

白芍藥 牡丹皮 紫石英火煨碎各一兩五錢 澤蘭兩 紫河車一其

水內洗去穢血用銀針挑去紫筋

右各藥俱咀片同河車入砂鍋內用陳老酒三碗陳米醋一碗

清白童便一碗米泔水數碗和勻傾入鍋內浮於藥寸許如尚

少再加米泔以鍋蓋蓋密勿令透氣桑柴火慢煮以河車融化

汁乾為度同藥俱取出在石柏內搗極爛捻作餅子日晒夜露

三晝夜宜在月滿之時以受日精月華仍焙乾為末煉蜜搗干

餘杵丸如桐子大每服五十丸漸加至八九十丸空心淡鹽湯

下隨用星飯使藥下行忌食生蘿菈○凡月經過期而行或少

之人而先施若將行腹痛兩月不來者血熱也亦來必數加條黃芩一二兩炒酒

在氣血兩虛之人而先類者將行腹痛者經水紫黑者肥人濕者婢妾多鬱者如晤之類皆非所宜雖有加減亦須斟酌

或不_行皆血寒血少也。尺脉必微弱。加桂心五錢。夏月三錢。黃芪一兩。灸。先期而來者血熱也。脉來必數。加條實黃芩二兩。炒酒製生地黃一兩五錢。腹痛加白芍藥一兩。凡經將行而腹中先作痛者血實而氣滯也。去血成塊者氣凝也。脉來弦數滑大。加玄胡索一兩。炒酒。陳皮八錢。廣木香柴胡稍各五錢。凡經水行後作痛者氣血俱虛也。尺脉必虛澁而兼緊。加炒乾姜三錢。白茯苓一兩。桂心夏月二錢。餘月五錢。凡經行三五日後腹中綿綿作痛。或淋瀝不止。血因氣滯未盡也。尺脉見沉澁。或沉弦。加廣木香五錢。柴胡六錢。凡經水紫色及黑色。血熱之甚也。尺脉見洪數。加條實黃芩一兩。黃柏一兩。炒。生地黃一兩五錢。酒浸。凡過期行經而色淡者。肥人則有濕痰。加白茯苓。水

或來或斷或
寒熱者此肝
經及心包絡
氣血不調

以多崩漏而
減香附艾葉
加荆樺黃芩
則治崩漏者
可想矣而阿
膠乾姜黃芪
之治崩又可
想其意也
事屬溫淫至
止小其苦心

陳皮蒼朮

水泔浸一宿
鹽水炒

各一兩

白朮五錢

減去熟地黃

一兩

瘦夫

則血虛少而水混之

加桂心五錢

經行或來或斷

或發寒熱者

加柴胡八錢

白茯苓一兩

凡經脈不調

多白帶者

肥人主胃

中濕痰流注

加製過蒼朮

白茯苓各一兩

五錢

減熟地黃一兩

凡瘦人氣多血少

脾虛加木香五錢

牡蠣

火

赤石脂

火

白茯苓

各一兩

凡多崩漏者

減香附艾葉各一兩

加荆芥穗

黑

炒

一

兩

黃芩一兩

五錢

血崩或多或少

加阿膠珠一兩

乾姜五錢

黑

炒

黃芪

一兩

元氣虛弱經水閉者

加牛膝二兩

洗

屬寒加桂心五

錢

屬熱加黃芩一兩

炒

酒

凡婢妾素見忌於嫡室者

必多抑鬱

以致經水不調

加味製香附二兩

或血弱心虛

交感時驚恐不

寧則精氣不聚

加琥珀

砂

酸棗仁

隔炒

茯苓神各一兩

辰砂

水

飛

紫

寧

治宮冷不孕

治宮冷不孕

治宮冷不孕

治宮冷不孕

治宮冷不孕

治宮冷不孕

治宮冷不孕

家則精氣不聚加琥珀砂酸東仁隔紗扶神各一二兩辰砂水

石莖各五錢

○治宮冷不孕

衝為血海任

調生丸一各誦

治婦人衝任虛寒胎孕不成成多損墜

澤蘭葉

當歸洗

熟地黃洗

川芎

白芍藥

牡丹皮

玄胡索

石斛酒浸炒

白朮一兩

乾姜炮

肉桂去皮各

五錢

右為末醋糊丸如桐子大每服五十丸空心酒下

調氣煖宮丸

當歸洗

川芎

肉桂各二

白芍藥煨

香附

艾葉醋

炒

阿膠蛤粉炒成

珠各四兩

右為末醋糊丸如桐子大每服五十丸食前米湯下

艾附煖宮丸○治婦人子宮虛冷帶下白淫面色痿黃四肢疼痛

主胞胎此方用四物養榮以白朮石斛養氣澤蘭丹皮玄胡索中之一穢乾姜肉桂煖子宮之寒去舊生新溫中益胃亦溫和之正方也

齊金綱目

卷六 求子諸方

二十

此方製向最妙分兩極當

此方妙在配合及酒浸三日之功

倦怠無力飲食減少經脉不調血無顏色肚腹時痛久無子息服藥更能戒惱怒生冷累用經驗

香附子

六兩用醋五斤以砂石罐煮一晝夜搗爛成餅慢火焙乾

艾葉

大者去枝梗

川芎

酒洗各三

兩大川芎

吳茱萸去梗黃芪

白芍藥

淡酒炒各二兩續斷

去蘆一兩五錢

生地黄

酒洗二兩官桂錢五

右其為細末用上好醋打糊凡如桐子大每服五七十九淡醋湯食遠下擇壬子日或天德月德日修合

勝金丸

一名女金丹

治婦人久虛或產後失調觸犯禁忌斷產少子

及經事遲來赤白帶下腰脚重痛寒熱不一身體瘦削眩暈嘔

逆此藥善調經候每日一丸若胎前三日一丸產後二日一丸

去一切雜證劫難具述珍之寶之

去一切雜證。効難具述。玆之寶之。

香附子

上五兩。醋浸三日。

當歸

川芎

白芍藥

人參

白朮

茯苓

甘草

桂心

白薇

玄胡索

牡丹皮

薏苡

香白芷

沒藥

另研

赤石脂

另研各一兩

右除香附沒藥赤石脂其餘十三味用好酒浸三日去酒晒乾通前香附一處為末方入沒藥石脂煉蜜為丸如彈子大每服一丸五更初嚼服溫酒送下白湯亦可此藥多在四十九丸後以癸水調平受孕為度倘有孕依前三日一服無所忌戒○一方去沒藥加沉香○一方去桂心加熟地黃丸如桐子大每服五十丸空心溫酒或白湯下以乾物壓之

白薇丸

治婦人月水不利四肢羸瘦漸覺虛乏

當歸

白薇

栢子仁

白芍藥

川芎

白朮

桂心

以溫行則可以治羸則不

以之補氣行
血則是以治
上熱忌非

附子 革薺

木香

檳榔

細辛

吳茱萸

各五錢

人參

白茯苓

石斛

川牛膝

澤蘭葉

各七錢半

牡丹皮

紫石英

各一兩

熟地黄

二兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心溫酒下

白薇丸 治婦人無子或斷經上熱下冷等病皆主之

白薇

熟地黄

川椒

去核及閉口者微炒出汁

白龍骨

各一兩

麥門冬

去心一兩半

藁木

卷柏

白芷

覆盆子

桃仁

湯浸去皮尖及仁麤微炒

黃

人參

白茯苓

桂心

菖蒲

遠志

去心各七錢半

車前子

當歸

微炒

苧莖

蛇床子

細辛

乾姜

炮谷五錢半

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心日午溫酒下○

昔有數人無嗣俱用此方踰年而皆有子故述之

昔有數人無嗣俱用此方踰年而皆有子故述之

秦桂丸 治婦人血海久冷不能孕育

附子 一方用香附 白薇 半夏 茯苓 杜仲 厚朴 當歸

秦艽 各三兩 防風 肉桂 乾姜 牛膝 沙參 各二兩二錢

細辛 人參 各四錢

右為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心酒下無効更加九

數經調受補者服七日即交合孕後忌服

艾附丸 此藥能煖子宮胎前產後各隨飲用

當歸 芍藥 熟地黃 生地黃 香附子

斷艾 各一兩 陳皮 藿香 白芷 牡丹皮

藁本 各五錢 丁香 木香 各三錢

右為細末酒糊丸每服三錢子宮冷熱酒下○白濁鹽湯下○

有燥濕溫經之治而無清順平和之性其真陰寒者不可服內有沙參未知其解

溫平之方

產後積血艾醋煎湯下

壬子丸。此藥服之。不過一月有孕。試之有效。

吳茱萸

白芨

白茯苓

白欬

各一兩

人參

桂心

沒藥

各四兩

乳香

川牛膝

厚朴

各五錢

當歸

石菖蒲

白附子

炮去皮
各一錢

右為細末。煉蜜丸。如桐子大。每服三四十九。溫酒或鹽湯下。日

進三服。用壬子日。雞犬不聞之處。修合。有孕毋服。無夫婦人不

可服。

南嶽魏夫人濟陰丹

治婦人血海虛冷。久無孕育。及數墮胎。一

切經候不調。崩中漏下。積聚諸證。

秦芫

人參

黃芩

石斛

甘草

蠶布燒灰

以水旺之日。而和溫熱之藥。其意欲求既濟之法也。而白芨白欬之用何居。

此方藥品雖多。自成一局。補氣而不

用芪朮。補血而不用白

芫。行血而

血而不用自

秦花

人參

黃木

石斛

甘草

燒

用丹皮、澤
蘭黃卷、行

氣而有本香
香附、蒼朮、川

椒、正血有
蚕布、京墨、

破血有桃石
丹皮、溫煖

則肉桂、乾姜
細辛、引經

則葉本、石斛
糯米和胃

而養陰、秦
凡行經而散

溫補而不滯
溫而不燥若

再執易涼
以燥易乎即

涼行之法也

桔梗 各二兩

京墨 服醋

木香

桃仁 去皮半炒

糯米 炒升

川芎

當歸

肉桂

乾姜 炮

細辛

牡丹皮 各一兩半

茯苓 二兩

熟地黃 酒蒸

香附子 炒

澤蘭葉 各四兩

川椒 炒去日

山藥 各三兩

蒼朮 米泔浸

大豆黃卷 炒半斤

一方川椒山藥各七錢半

右為末、煉蜜為劑、每兩作六丸、每服一丸、細嚼空心溫酒醋湯

在下、或以醋調和丸、如桐子大、每服五十丸亦可

石莢丸 治婦人子宮久冷、不成孕育、及數經墮胎、月候不勻

崩中漏下、七癥八瘕、白淫白帶、並宜服之

紫石英

天門冬

桂心

川芎

卷柏

烏頭 炮

此與前方相
表裏而餘糧
烏賊又有燥
溫並帶之功
天冬和寸冬
有清潤燥
之用惟用古
者能斟酌之

熟地黃

辛夷仁

禹餘糧

炒醋

當歸

石斛

各三兩

紫葳

牡蒙

各二兩

粉草

烏鰂骨

燒灰

薯蕷

各一兩半

牛膝

栢子仁

炒

吳茱萸

桑寄生

牡丹皮

人參

細辛

厚朴

續斷

乾姜

炮一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心米飲溫酒任下

溫胞湯

治婦人全不產育及斷絕久不產三三十年者

朴硝

牡丹皮

當歸

大黃

蒸一飯久

桃仁

各三兩

細辛

厚朴

姜汁

苦梗

赤芍藥

人參

茯苓

桂心

甘草

牛膝

陳皮

各二兩

附子

炮一兩半

蝱蟲

炒焦去翅足

水蛭

炒各十枚

右為末每服六錢水酒各半盞煎至六分溫服日二服夜一服

此方為專治
斷產者設

溫覆得少汗必下積血與冷赤膿如小豆汁斟酌不盡若力弱
大困不堪者只一二服止如惡物不盡用坐導藥

坐導藥 治婦人全不產及斷續服前湯胞湯惡物不盡用此方

皂角

去皮子一兩

吳茱萸

當歸各一兩

大黃

細辛

五味子

乾姜

炮各一兩

白礬

枯

戎鹽

蜀椒

各半兩

一方無大黃有黃葵花半兩

右為細末以絹袋盛如指狀人婦入陰戶中坐臥任意勿行走
小便時去之一日一度易新者必下清黃冷汁汁盡止若未見
病出可十日去之本為子宮有冷惡物故令無子值天陰冷則
發疼痛須俟病出盡方已不可中輟每日早晚用苦菜煎湯薰
洗之

烏魚骨原根
素高蘭茹烏
賊來

痰在上須用
子和法

不用地黃

不用四物

內藥續生丸

母丁香 附子 肉荳蔻 枯礬 烏魚骨

右為末糊為軟丸綿裹內陰中

治痰塞不孕

丹溪植芝湯 治婦人肥盛無子以身中有脂膜閉塞子宮也宜

先服此調理

當歸 酒洗 一兩 川芎 七錢 白芍藥 白朮 半夏湯

香附 陳皮 各一兩 茯苓 二兩 甘草 半兩

右剉作十貼加生姜三片水煎吞後丸

丹溪茂芝丸

白朮 二兩 半夏 麴 川芎 香附子 各一兩 茯苓

不用四物

白木二 半夏 橘紅 川芎

香附子 各一 茯苓

月只定黃連

丹溪深闕秦

桂凡之非而

蝨期乃又為

取用豈自相

左即仲各四

其病而為去

取耳

要知南星滑
石防風羌活
之意

申麴炒各半兩 橘紅錢 甘草

右為末。粥丸如桐子大。每服八十丸。煎湯下。

如執參加黃連。枳實各一兩。服此藥後却服蝨斯丸。

蝨斯丸。即前秦桂丸。無當歸防風二味。

右每服五丸。空心酒下。加至十丸不妨。覺有娠三月後不可更

服。按此方即秦桂丸也。丹溪忌服之者。蓋忌於瘦人無與者。

若肥人濕多者。又兼前調理藥。而所服丸數。十減其五。只服五

分無妨也。累試有效。

消脂膜道痰湯

半夏姜製 南星火炮

滑石研細各一錢

橘紅

川芎

枳殼去穢炒 茯苓

防風

羌活各五分

濟陰綱目

卷下 婦人不孕方

三五

車前子七分

右細切作一服。加生姜五片。水煎空心服。以乾物壓之。
一方。治肥盛婦人。稟受甚厚。恣於酒食。經水不調。不能成胎。謂之軀脂滿溢。閉塞子宮。

又加參朮

南星 半夏 羌活 蒼朮 白芍

防風 滑石

右剉水煎服。或導痰湯亦可。

○治婢妾不孕

煮附丸。治婢妾多憂情。不宜暢。經多不調。故難孕。此方最妙。不須便服他藥。

可與神仙附
益元並駕

香附子不拘多少。去毛與麝皮。米泔水浸一宿。曬乾。用土好

米醋砂鍋內煮之。旋冰醃旋煮。以極爛為度。取出。焙乾。為末。

妙在多醋意

姑存之試之

米醋砂鍋內煮之。旋添醋旋煮。以極爛為度。取出焙乾為末。仍用醋糊為丸。如桐子大。每服五七十丸。經不調即調。久不孕者亦孕。

一方治婦人妬妄悞夫無子。常服不妬。此即化妬丸也。未必驗。

天門冬去心 赤黍米去殼微炒 薏苡仁去殼炒

右為末。煉蜜丸。桐子大。每服八九十丸。白湯下。

○附斷子法

用白麪麴一升。無灰酒五升。打作糊。煮二升半。用絹帛濾去渣。作三服。候月經將來日。晚下吃一服。天明吃一服。月經即行。終身絕子。○一方用故蠶紙方圓一尺。燒為末。酒飲調服。終身不復懷孕。一云產後酒服之。○又方用油煎水銀。一日方息。空

心服棗核大一丸。永斷孕不損人。○一方四物湯五錢加薑
薑子二錢。於經行後空心溫服。

良方論曰。易曰。天地之大德曰生。然婦人有臨產艱難。或生育
不已而欲斷之。故錄驗方以備用。若服水銀。蠱蟲。水蛭之類。不
惟孕不復懷。且禍在反掌。○薛氏曰。大抵斷產之法。多用峻厲
往往有不起者。是則產之害。未若斷產之害也。吾聞閭老張羅
峰。太常率恒齋之夫人。俱因服斷產之劑。自謂形體俱怯。遇勞
必病。有由然矣。按夷堅志載。東京女子曰牡丹。以售墮胎藥。生
得惡報。今雖列如上方。以備萬一之用。用者尚其慎之。

